


Elanco

CHEGOU



VarenzinTM

A **revolução** no tratamento
da **anemia** relacionada à
Doença Renal Crônica (DRC)





Varenzin™ (molidustat) é uma solução oral palatável sabor peixe,* de administração diária, conveniente e fácil de dosar.

Varenzin™ é administrado por via oral, uma vez ao dia, na dose de 5 mg/kg, por até 28 dias consecutivos.

O tratamento pode ser repetido depois de uma pausa de, no mínimo, sete dias.

*Varenzin™ possui aroma de óleo de peixe, incorporado em uma base de óleo de girassol

Tabela de Dosagem

Peso (kg)	Volume de Varenzin™ (mL)
2.2	0.4
2.5	0.5
3.0	0.6
3.5	0.7
4.0	0.8
4.5	0.9
5.0	1.0
5.5	1.1
6.0	1.2

Revolucione o tratamento da anemia no felino com DRC

Monitoramento e Repetição do Tratamento

Varenzin™ : Monitoração do tratamento	
1º DIA	Início do tratamento
14º DIA	Hematócrito
21º DIA	Hematócrito
28º DIA	Hematócrito
PAUSA/INTERVALO DE 7 DIAS	

REINICIAR O TRATAMENTO POR 4 SEMANAS CONSECUTIVAS
PAUSA/INTERVALO DE 7 DIAS
(Avaliação de hematócrito semanalmente)

Interrompa o tratamento com Varenzin™ se o HT exceder o limite superior do intervalo de referência. O intervalo entre ciclos de tratamento é variável entre pacientes felinos e pode oscilar ao longo do tempo individualmente. Entretanto, recomenda-se um intervalo mínimo de 7 dias. Consulte a bula do produto para informações adicionais quanto à monitorização do tratamento com Varenzin™.



Acesse:
ElancoVets
.com.br

