

Soulagez le prurit
Accédez à la zenitude

Elanco™

Optez pour...

Zenrelia™



Poids du chien (kg)	Dosage et nombre de comprimés à administrer			
	4,8 mg	6,4 mg	8,5 mg	15 mg
3,0-4,0	0,5	-	-	-
4,1-5,3	-	0,5	-	-
5,4-6,5	-	-	0,5	-
6,6-8,0	1	-	-	-
8,1-10,6	-	1	-	-
10,7-14,1	-	-	1	-
14,2-16,0	-	1,5	-	-
16,1-19,5	-	-	1,5	-
19,6-24,9	-	-	-	1
25,0-28,3	-	-	2	-
28,4-37,4	-	-	-	1,5
37,5-49,9	-	-	-	2
50,0-62,4	-	-	-	2,5
62,5-74,9	-	-	-	3
≥75	Administrez la combinaison de comprimés appropriée			

Blisters de 10, disponibles
en pack de 30 et pack de 90

Taille des comprimés



4,8 mg



6,4 mg



2 cm



8,5 mg



15 mg



2 cm

Zenrelia™ est disponible
en **4 dosages**,
à la posologie de
0,6-0,8 mg d'ilunocitinib/kg,
une fois par jour.



La zenitude pour les chiens,
les propriétaires et les vétérinaires.



SOULAGEZ LE PRURIT ET L'INFLAMMATION CUTANÉE*

Une diminution rapide, constante et durable du prurit et de l'inflammation de la peau.¹



ACCÉDEZ À LA ZENITUDE

Plus de chiens atteignent une rémission clinique du prurit et des lésions cutanées avec Zenrelia™ vs l'oclacitinib.¹



FACILITEZ L'OBSERVANCE

Une fois par jour dès le premier jour.



L'utilisation chez les chiens âgés de moins de 12 mois ou pesant moins de 3 kg doit être basée sur une évaluation du rapport bénéfice-risque par le vétérinaire traitant.

* Chez les chiens atopiques.

1. FORSTER, Sophie, BOEGEL, Annette, DESPA, Simona, et al. Comparative efficacy and safety of ilunocitinib and oclacitinib for the control of pruritus and associated skin lesions in dogs with atopic dermatitis. Veterinary Dermatology, 2025. Étude réalisée sur 338 chiens de propriétaires, en Allemagne, Irlande, Hongrie et Portugal, 2021-2022, avec Zenrelia™.

ZENRELIA™ 4,8 MG/ 6,4 MG/ 8,5 MG/ 15 MG COMPRIMÉS PELLICULÉS POUR CHIENS. **Espèce de destination :** Chiens. **Composition :** Chaque comprimé pelliculé contient 4,8 mg/ 6,4 mg/ 8,5 mg/ 15 mg d'ilunocitinib. **Indications :** Traitement du prurit associé aux dermatites allergiques chez le chien. Traitement des manifestations cliniques de la dermatite atopique chez le chien. **Contre-indications :** Ne pas utiliser chez les chiens présentant des signes d'immunosuppression. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. **Effets indésirables :** Chiens : Fréquent (1 à 10 animaux / 100 animaux traités) : Vomissement, Diarrhée, Léthargie. Peu fréquent (1 à 10 animaux/1 000 animaux traités) : Papillome, Kyste interdigital. **Lire attentivement la notice avant utilisation.** **Catégorie :** Médicament vétérinaire soumis à ordonnance. VAD 06/2025.

Elanco France SAS au capital de 1.708.200 € – RCS 417 350 386 Nanterre, Crisco Uno Bâtiment C, 3-5 Avenue de la Cristallerie, 92310 Sèvres Cedex © 2025, Elanco ou ses filiales. PM-FR-25-0143- 08/2025

Zenrelia™ (ilunocitinib) est indiqué pour le traitement du prurit associé aux dermatites allergiques et/ou le traitement des manifestations cliniques de la dermatite atopique chez le chien.

