

O seu cão coça-se muíto?

Descubra mais informações sobre a
dermatite alérgica/atópica em cães



> Porque é que o meu cão tem tanta comichão?

Se o seu cão se coça com frequência, pode estar a sofrer de prurido alérgico, mais conhecido como comichão, um problema generalizado entre os cães.

Existem quatro formas comuns de prurido alérgico:^{1,2}

- ✔ **Dermatite atópica canina (DAC)**, causada por alérgenos ambientais como o pólen ou os ácaros do pó doméstico.
- ✔ **Alergia a parasitas**, como as pulgas.
- ✔ **Alergias alimentares**, muitas vezes a fontes específicas de proteína na comida do seu cão, como o frango.
- ✔ **Alergias de contacto**, relacionadas com substâncias químicas, por exemplo, no solo ou nos brinquedos do seu cão.


Dependendo do alérgeno, o seu cão pode ter comichão durante todo o ano ou apenas durante certas épocas.

> O que é a dermatite atópica canina (DAC)?

A DAC é uma das causas mais comuns de prurido alérgico. É uma condição vitalícia que frequentemente se desenvolve durante os primeiros anos de vida do seu cão. Inicialmente, a pele pode parecer normal, mas coçar, lambe, morder e esfregar continuamente causam perda de pelo e danos na pele, o que pode levar a infeções secundárias por bactérias ou fungos.

Embora não exista uma cura real para a DAC, esta pode ser **mantida sob controlo** com um tratamento adequado.^{2,3}

> Áreas mais afetadas na DAC⁴



> Como é que o meu cão é tratado?

O seu médico veterinário irá estabelecer consigo um **plano terapêutico personalizado** para o seu cão com comichão, que o ajudará a melhorar a sua qualidade de vida.

O tratamento da DAC é geralmente multimodal e pode envolver várias medidas concomitantes, tais como:

- Uso de champôs especiais
- Tratamento antiparasitário
- Tratamento anti-infeccioso
- Dieta específica e/ou suplementos
- Uso de moléculas imunomoduladoras para controlar comichão e inflamação

Dependendo da melhoria do seu cão, **o seu médico veterinário ajustará o plano conforme necessário.**^{2,5}



> Controle o nível de prurido do seu cão

Utilize a seguinte escala para medir o nível de prurido do seu cão ao longo do tempo^{6,7}. Ajudará o seu médico veterinário a monitorizar o tratamento estabelecido e a adaptá-lo, se necessário.

10

Prurido extremo
Prurido extremo/contínuo. O meu cão não para de se coçar, independentemente do ambiente envolvente ou de comandos, e precisa de ser fisicamente restringido.

8-9

Prurido grave
O prurido interrompe o sono, a alimentação, a brincadeira e o exercício do meu cão. O prurido continua mesmo quando o meu cão está distraído.

6-7

Prurido moderado
O meu cão tem comichão periodicamente o longo do dia, mas não quando come, brinca, faz exercício ou está distraído. O prurido observado ocorre à noite.

4-5

Prurido leve
O meu cão não tem comichão quando come, brinca, faz exercício ou está distraído.

2-3

Prurido muito leve
O meu cão só tem um pouco mais de comichão do que eu considero normal.

0-1

Cão normal
O prurido não é um problema para o meu cão.

INTENSIDADE DO PRURIDO		DIA									
		1	2	3	4	5	6	7	14	21	28
Extremo	10										
Grave	8-9										
Moderado	6-7										
Leve	4-5										
Muito Leve	2-3										
Normal	0-1										

Lembre-se sempre de consultar o seu médico veterinário para obter aconselhamento específico sobre a saúde do seu animal de estimação.