



ZOLVIX™

FICHA TÉCNICA





Antihelmíntico oral de amplio espectro



FÓRMULA

Monepantel 2,5 g
Vehículo c.s.p. 100,0 mL

INDICACIÓN

Zolvix™ es un antihelmíntico de amplio espectro, miembro de una nueva clase de antihelmínticos, derivados del Aminoacetonitrilo (AADs), **indicado para el tratamiento y control de parasitosis en ovinos y bovinos**, causadas por nematodos gastrointestinales sensibles a los AADs, incluidas cepas resistentes a lactonas macrocíclicas (moxidectina, ivermectina, abamectina, etc.), a benzimidazoles (albenzadole, febendazole, oxfendazole, etc.), a levamisol y morantel.



DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Solución oral lista para su uso. Utilice el aplicador adecuado para el producto. La dosis recomendada es de 2,5 mg de Monepantel por kg de peso vivo, lo que se consigue aplicando 1 mL de producto por cada 10 Kg de peso vivo, conforme a la tabla abajo detallada para cada especie:

Tabla de dosificación para Bovinos:

Peso corporal (kg)	Dosis (mL)
70-100	10
101-150	15
151-200	20
201-250	25
251-300	30
301-350	35
351-400	40
401-450	45
451-500	50
501-550	55
551-600	60
601-650	65

Animales >650 kg peso deberán dosificarse a razón de 5 mL/50kg

Tabla de dosificación para Ovinos:

Peso vivo (kg)	Dosis (mL)
10-15	1,5
16-20	2,0
21-25	2,5
26-30	3,0
31-35	3,5
36-40	4,0
41-50	5,0
51-60	6,0
61-70	7,0
71-80	8,0

Animales >80 kg peso deberán dosificarse a razón de 1 mL/10kg.

ESPECTRO DE EFICACIA (estadios maduros/adultos e inmaduros/larvales)



OVINOS

Haemonchus contortus; *Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta*; *Ostertagia (Teladorsagia) trifurcata*; *Trichostrongylus colubriformis*; *Trichostrongylus vitrinus*; *Trichostrongylus rugatus*; *Trichostrongylus axei*; *Nematodirus filicollis*; *Nematodirus spathiger*; *Nematodirus abnormalis*; *Cooperia curticei*; *Cooperia oncophora*; *Chabertia ovina*; *Oesophagostomum venulosum*.



BOVINOS

Haemonchus placei; *Haemonchus contortus*; *Ostertagia Ostertagi*; *Trichostrongylus axei*; *Cooperia punctata*; *Cooperia oncophora*; *Cooperia pectinata*; *Cooperia mcmasteri*; *Nematodirus helvetianus*; *Bunostomum phlebotomum*; *Oesophagostomum radiatum*.

La administración podrá repetirse, dependiendo de la situación epidemiológica de las diferentes áreas, debiendo consultar al Médico Veterinario. Una muestra representativa de los animales a ser tratados debe ser pesada antes del tratamiento, calcule la dosis tomando como base el del animal mas pesado del grupo, **NO UTILICE subdosis**. La dosis debe ser ajustada en aplicador antes de iniciar el tratamiento. Cuando haya una gran variación del tamaño dentro del grupo, la dosis debe ser basada en las recomendaciones del prospecto para cada grupo de pesos. Se recomienda una correcta técnica de administración: posicionar cuidadosamente el aplicador en el lateral de la boca y sobre la parte de atrás de la lengua antes de administrar la dosis.

Monepantel pertenece a una nueva clase de antihelmínticos, derivados de aminoacetónitrilo (AADs), que no tienen resistencia conocida debido a su nuevo modo de acción.

La resistencia puede ser desarrollada en cualquier molécula como ha sido relatada para las lactonas macrocíclicas, benzimidazoles, levamisol, morantel y closantel y en varias combinaciones de estos antihelmínticos. Consulte a su Médico Veterinario sobre la mejor estrategia de control de parásitos en su región a fin de reducir el desarrollo de resistencias. Es recomendable realizar un test de resistencia antes de elegir las drogas a utilizar.

PERÍODO DE RETIRADA

Bovinos y Ovinos:

Carne: Suspender el uso del producto 7 días antes del sacrificio para el consumo humano. **Leche:** No utilizar en animales productores de leche o derivados para el consumo humano.

PRECAUCIONES GENERALES

Después de utilizar limpie el aplicador con agua común y jabón, y enjuague con agua fría. Los cuidados de uso, limpieza y buen acondicionamiento del aplicador garantizan la precisión del dosaje.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

ZOLVIX™ posee un amplio margen de seguridad cuando es utilizado de acuerdo con las recomendaciones y es rápidamente aceptado por los animales tratados.

Animales preñados pueden ser tratados cuando sean tomados los cuidados normales de manejo.

En caso de derrame accidental sobre la piel u ojos, lavar inmediatamente con agua. Elimine cualquier ropa contaminada. No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Lavarse las manos y piel expuesta antes de comer y después del trabajo.

No contaminar lagunas, cursos de agua o canales con el producto o recipientes usados. No destinar residuos líquidos en arroyos.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar el producto en su envase original, en lugar fresco y seco, entre 15°C e 30°C, al abrigo de la luz solar.

ADVERTENCIAS

No administrar a terneros menores de 12 semanas de edad o menores a 70 kg de peso.

