

1000 dosis  
500 mL

**BURSAL DISEASE-NEWCASTLE DISEASE-  
BRONCHITIS-REOVIRUS VACCINE  
STANDARD AND VARIANT  
MASS. AND ARK. TYPES, KILLED VIRUS**

1000 doses  
500 mL

**VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD  
INFECCIOSA DE LA BOLSA  
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE  
BRONQUITIS INFECCIOSA Y LA  
INFECCIÓN DE REOVIRUS AVIAR  
ESTANDARE Y VARIANTE  
TIPOS MASS. Y ARK., VIRUS INACTIVADO**

*AviPro™ 442*  
**ND-IB2-BTO2-REO**

**1000 doses - 500 mL / 1000 dosis - 500 mL**

FOR USE IN ANIMALS ONLY / SOLO PARA USO EN ANIMALES

AviPro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

© 2021 Elanco or its affiliates.

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 16 semanas de edad o mayores contra la enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa (tipos Mass. y Ark.) y la variante AL-2 de la enfermedad infecciosa de la bolsa, y proporciona protección pasiva a la progenie contra el síndrome de malabsorción y tenosinovitis relacionada con el reovirus y la enfermedad infecciosa de la bolsa tipo 1, cepas estándar y variantes. La duración de la inmunidad para este producto no ha sido establecido. Para obtener más información sobre la eficacia y seguridad, diríjase a productdata.aphis.usda.gov. La protección de la progenie contra la variante AL-2 no ha sido determinada.

**Instrucciones de uso:** La vacuna debe calentarse a temperatura ambiente antes de su uso. Agitar bien antes y durante el uso.

Injectar subcutáneamente.

Vacunar (previamente) con vacunas de virus vivo contra la enfermedad infecciosa de la bolsa, enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa y tenosinovitis, por lo menos 4 semanas antes de usar esta vacuna.

Vacunar entre las 16 y 20 semanas de edad.

No se ha establecido un calendario de revacunación para este producto; se recomienda consultar con un veterinario.

**Dosis:** 1/2 mL (0.5 mL) por ave. Inyectar todas las aves de la parvada. Contiene penicilina y estreptomicina como preservantes.

**Temperatura de almacenamiento:** Almacenar entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar.

**Advertencias:** En caso de exposición a humanos, contacte a un médico. No vacune dentro de los 42 días previos al sacrificio. Utilizar todo los contenidos una vez abierto. No mezclar con otros productos a excepción que sea indicado en el rotulado del producto.

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 16 weeks of age or older against Newcastle disease, infectious bronchitis (Mass. and Ark. types) and the AL-2 variant of infectious bursal disease, and to provide passive protection of progeny against reovirus-related malabsorption syndrome and tenosynovitis, and type 1 infectious bursal disease, standard and variant strains. Duration of immunity has not been established for this product. For more information regarding efficacy and safety data, see productdata.aphis.usda.gov. Protection of progeny against the AL-2 variant has not been demonstrated.

**Directions for use:** Vaccine should be warmed to room temperature before use. Shake well before and during use.

Inject subcutaneously.

Vaccinate (prime) with live virus vaccines for infectious bursal disease, Newcastle disease, infectious bronchitis and tenosynovitis at least 4 weeks prior to the use of this vaccine. Vaccinate between 16 and 20 weeks of age.

A revaccination schedule has not been established for this product; consultation with a veterinarian is recommended.

**Dose:** 1/2 mL (0.5 mL) per bird. Inject all birds in flock.

Contains penicillin and streptomycin as preservatives.

**Storage temperature:** Store at 2° to 8°C (35° to 46°F). Do not freeze.

**Warnings:** In case of human exposure, contact a physician. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Use entire contents when first opened. Do not mix with other products, except as specified on the labeling.

Manufactured in the USA by/Fabricado en los EE.UU. por:

**Elanco US Inc.**

Winslow, Maine 04901 USA

Phone 1-800-428-4441

VLN/PCN 196/12M5.42

**Elanco**  
TM