

# NEWCASTLE-PARAMYXOVIRUS VACCINE TYPE 3 KILLED VIRUS

*AviPro*<sup>™</sup> 233  
ND-PMV3 CONC

1000 doses - 300 mL

For use in animals only

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy turkeys 20 weeks of age or older against Newcastle disease and disease caused by avian paramyxovirus, type 3. Duration of immunity has not been established for this product. For more information regarding efficacy and safety data, see [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**Directions for use:** Vaccine should be warmed to room temperature before use. Shake well before and during use. Inject subcutaneously.  
Vaccinate turkeys between 20 and 24 weeks of age.  
Revaccinate 4 to 6 weeks later.

**Dose:** 3/10 mL (0.3 mL) per bird. Inject all birds in flock.

**Storage temperature:** Store at 2° to 8°C (35° to 46°F).  
Do not freeze.

**Warnings:** In case of human exposure, contact a physician. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Use entire contents when first opened. Do not mix with other products, except as specified on the labeling.

Manufactured in the USA by/Fabricado en los EE.UU. por:  
**Elanco US Inc.**  
Winslow, Maine 04901 USA  
Phone 1-800-428-4441  
VLN/PCN 196/17P5.10

AviPro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

# VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y PARAMYXOVIRUS TIPO 3 VIRUS INACTIVADO

*AviPro*<sup>™</sup> 233  
ND-PMV3 CONC

1000 dosis - 300 mL

Solo para uso en animales

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pavos sanos de 20 semanas de edad o mayores contra la enfermedad de Newcastle y la enfermedad causadas por paramyxovirus de aviar, tipo 3. La duración de la inmunidad para este producto no ha sido establecido. Para obtener más información sobre la eficacia y seguridad, dirijase a [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**Instrucciones de uso:** La vacuna debe calentarse a temperatura ambiente antes de su uso. Agitar bien antes y durante el uso.  
Inyectar subcutáneamente.  
Vacunar pavos entre 20 y 24 semanas de edad.  
Revacunar 4 a 6 semanas después.

**Dosis:** 3/10 mL (0.3 mL) por ave. Inyectar todas las aves de la parvada.

**Temperatura de almacenamiento:** Almacenar entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar.

**Advertencias:** En caso de exposición a humanos, contacte a un médico. No vacune dentro de los 42 días previos al sacrificio. Utilizar todo los contenidos una vez abierto. No mezclar con otros productos a excepción que sea indicado en el rotulado del producto.

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

