



Dose múltipla
Hidrorrepelente
Frasco aplicador

Código Comercial

1 Kg

MN4381001BL

Composição

Cumatestralil 0,75% (p/p)

Formulação

Pó de contato

Indicações de uso

Raticida pó de contato hidrorrepelente, para uso profissional e em campanhas de saúde pública, no controle de ratas (Rattus norvegicus). Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias e comércios.

Mecanismo de ação

Raticida anticoagulante de primeira geração de dose múltipla; interrompe o ciclo de formação da vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue; causando hemorragias e consequentemente a morte dos roedores. Ela ocorrerá de 3 a 7 dias após a ingestão da dose suficiente do raticida.

Apresentação

Frasco talqueira de 1 Kg, caixa com 12 Kg.

Lanirat™

LANIRAT PÓ

Fórmula hidrorrepelente e de fácil aplicação

Modo de usar

Aplicar o raticida onde os roedores vivem e transitam como tocas, trilhas e túneis, através de polvilhadeira ou do próprio frasco aplicador do pó de contato; Polvilhar em faixas de 5 a 15 cm de largura e 35 a 45 cm de comprimento; quando possível, recomenda-se dispor o raticida em caixas porta iscas para proteção do produto e dificultar o acesso para espécies não alvo no controle; Os pontos de aplicação devem ser inspecionados após 2 ou 3 dias, para verificar a necessidade de nova aplicação ou remanejamento das caixas porta iscas; É importante manter as caixas porta iscas fixadas, fechadas, identificadas e mapeadas; os pontos de aplicação devem ser distantes ou fora do alcance de crianças e animais domésticos; não aplicar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos ou outros materiais.

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Durante o manuseio usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não beber, fumar ou comer durante a aplicação. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida ao ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água. Não reutilizar as embalagens. Manter o produto na embalagem original. Formulação contém substância amargante que previne a ingestão acidental por humanos.



Fórmula molecular

$C_{19}H_{16}O_3$
Cumatetralil

Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos - Ativo.....> 16,5 mg i.a/Kg

DL50 dermal aguda para ratos - Ativo..> 40 mg i.a/Kg

Classificação toxicológica

Cumatetralil - Classe I

FABRICADO POR:

NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, nº 964

Distrito Industrial - Pindamonhangaba/SP

CEP: 12412-800

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Indústria Brasileira

E-mail: sac@neogen.com

DISTRIBUÍDO POR:

Elanco Saúde Animal LTDA

Rua Edgar Marchiori, nº 255 setor Elanco

Distrito Industrial - Vinhedo/SP

CEP: 13288-006

CNPJ: 00.820.120.0004-88

Período de reentrada

Não é necessário desocupar a área para realizar a aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Se houver ingestão do produto poderá ocorrer náuseas, vômitos e após alguns dias, equimoses, sangramentos excessivos após traumatismos, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina, hemorragias maciças que podem levar à morte.

Armazenagem

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente e em local prévio e adequadamente destinado a esta finalidade. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

Vazamento acidental

Isolar a área. Usar luvas impermeáveis e recolher o produto para área de descarte de lixo químico.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos lavar com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque o vômito.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Cumatetralil

Grupo químico: Cumarínico

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 / Tratamento Sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: 3.0425.0188

Nº do CAS: Cumatetralil : 5836-29-3

