

Vælg den eller de behandlinger der passer til behovet i din besætning

Generelt

Tonistry Px skal opløses i rent vand, temperatur ikke over 30°C
Rør eller pisk blandingen godt til pulveret er fuldstændig opløst
Bland kun opløsning til én fodring ad gangen
Skåle skal rengøres inden brug

I farestalden:

Til nyfødte grise fra kuldudligning og 7 dage frem

Opløs Tonistry Px, 2 målebægre á 155 gram (310 gram) i 10 liter vand

- Giv 500 ml af opløsningen pr. kuld, 600 ml hvis der er over 14 grise i kullet
- Tonistry Px opløsningen gives i skåle én gang dagligt

Omkring fravænning:

3 dage før og 4 dage efter fravænning

Opløs Tonistry Px, 2 målebægre á 155 gram (310 gram) i 10 liter vand

- Giv 500 ml af opløsningen pr. kuld, 600 ml hvis der er over 14 grise i kullet
- Tonistry Px gives i skåle én gang dagligt de sidste 3 dage før fravænning
- Fra fravænning og 4 dage frem gives 80-100 ml / gris af opløsningen én gang dagligt
- Både i farestalden og i klimastalden gives blandingen hen over tørfoder

I klimastalden:

Fra fravænning og i mindst 5 dage

Opløs Tonistry Px, 2 målebægre á 155 gram (310 gram) i 10 liter vand

- Giv 80-100 ml af opløsningen pr. gris over tørfoder én gang dagligt i 5 dage eller så længe der er behov for det

I øvrigt

Tonistry Px opløsning kan gives i stressede perioder. Ved tilvænning til andet foder, efter sygdom etc.

Opbevaring og håndtering

Tonistry Px opbevares rent og tørt ved stuetemperatur
Produktet må ikke udsættes for fugt eller sollys
Posen lukkes omhyggeligt efter brug så pulveret ikke udsættes for fugt.

**For nøjagtig opblanding
brug Tonistry Px målebæger,
som medfølger**



Tonistry Tonistry Px Instructions for use

Select the best protocol based on your objective:

General remarks

Tonistry Px must be mixed in clean water, temperature not exceeding 30°C
Stir well or whisk the mixture until the powder is completely dissolved
Only mix solution for one feeding at a time
Bowls must be clean before use

In the farrowing unit:

Newborn pigs from litter leveling and 7 days onwards

Mix two 155 g scoops (310 g) of Tonistry Px in 10 litres of water

- Give 500 ml of the solution per litter, 600 ml if there are more than 14 piglets in the litter
- Tonistry Px solution is given once daily in bowls

Around weaning:

3 days before and 4 days after weaning

Mix two 155 g scoops (310 g) of Tonistry Px in 10 litre of water

- Give 500 ml of the solution per litter, 600 ml if there are more than 14 piglets in the litter
- Tonistry Px is given in bowls once daily for the last 3 days before weaning
- The first 4 days after weaning, 80-100 ml / pig of the solution is given once daily
- In both the farrowing unit and the clima stable, the mixture is given over dry feed

Weaning section:

From weaning and at least 5 days onwards

Mix two 155 g scoops (310 g) of Tonistry Px in 10 litres of water

- Give 80-100 ml of the solution per pig over dry feed once daily for 5 days or as long as needed

Other

Tonistry Px solution can be given during stressful periods, change of feed, after illness, etc.

Storage and handling

Tonistry Px must be stored in a clean and dry environment at room temperature

The product must not be exposed to moisture or sunlight

The bag must be closed carefully after use so that the powder is not exposed to moisture.



**For accurate mixing,
use the scoop provided**

