

**NEWCASTLE-BRONCHITIS  
VACCINE  
MASS. TYPE, KILLED VIRUS  
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM  
BACTERIN**

**AviPro™ 304  
ND-IB-MG**

**1000 doses - 500 mL**

For use in animals only

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 6 weeks of age or older against Newcastle disease, infectious bronchitis (Mass. type) and *Mycoplasma gallisepticum*. Duration of immunity has not been established for this product. For more information regarding efficacy and safety data, see [productdata.aphis.usda](http://productdata.aphis.usda).

**Directions for use:** Vaccine should be warmed to room temperature before use. Shake well before and during use. Inject subcutaneously. Vaccinate (prime) with a live Newcastle-Bronchitis Vaccine (Mass. type) at least 3 weeks prior to the use of this vaccine. Vaccinate at 6 weeks of age or older. Revaccinate 3 to 6 weeks later.

**Dose:** 1/2 mL (0.5 mL) per bird. Inject all birds in flock. Contains penicillin as a preservative.

**Storage temperature:** Store at 2° to 8°C (35° to 46°F). Do not freeze.

**Warnings:** In case of human exposure, contact a physician. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Use entire contents when first opened. Do not mix with other products, except as specified on the labeling.

Manufactured in the USA by/Fabricado en los EE.UU. por:  
**Elanco US Inc.**  
Winslow, Maine 04901 USA  
Phone 1-800-428-4441  
VLN/PCN 196/48B5.10

AviPro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

**VACUNA CONTRA  
LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE  
Y BRONQUITIS INFECCIOSA  
TIPO MASS., VIRUS INACTIVADO  
BACTERINA  
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM**

**AviPro™ 304  
ND-IB-MG**

**1000 dosis - 500 mL**

Solo para uso en animales

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 6 semanas de edad o mayores contra la enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa (tipo Mass.) y *Mycoplasma gallisepticum*. La duración de la inmunidad para este producto no ha sido determinada. Para obtener más información sobre la eficacia y seguridad, diríjase a [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**Instrucciones de uso:** La vacuna debe calentarse a temperatura ambiente antes de su uso. Agitar bien antes y durante el uso. Inyectar subcutáneamente. Vacune (previamente) con una vacuna viva de bronquitis y Newcastle (tipo Mass.), por lo menos 3 semanas antes de usar esta vacuna. Revacunar a las 6 semanas de edad o mayores. Revacunar de 3 a 6 semanas después.

**Dosis:** 1/2 mL (0.5 mL) por ave. Inyectar todas las aves de la parvada. Contiene penicilina como preservativo.

**Temperatura de almacenamiento:** Almacenar entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar.

**Advertencias:** En caso de exposición a humanos, contacte a un médico. No vacune dentro de los 42 días previos al sacrificio. Utilizar todo los contenidos una vez abierto. No mezclar con otros productos a excepción que sea indicado en el rotulado del producto.

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.