

# AVIAN REOVIRUS VACCINE KILLED VIRUS

*AviPro*<sup>™</sup> 106  
REO

1000 doses - 500 mL

For use in animals only

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 16 weeks of age or older to provide passive protection of progeny against reovirus-related malabsorption syndrome. Duration of immunity has not been established for this product. For more information regarding efficacy and safety data, see [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**Directions for use:** Vaccine should be warmed to room temperature before use. Shake well before and during use. Inject subcutaneously. Vaccinate (prime) with live virus tenosynovitis vaccine at least 4 weeks prior to the use of this vaccine. Vaccinate between 16 and 20 weeks of age. Revaccinate 4 to 6 weeks later.

**Dose:** 1/2 mL (0.5 mL) per bird. Inject all birds in flock. Contains penicillin and streptomycin as preservatives.

**Storage temperature:** Store at 2° to 8°C (35° to 46°F). Do not freeze.

**Warnings:** In case of human exposure, contact a physician. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Use entire contents when first opened. Do not mix with other products, except as specified on the labeling.

Manufactured in the USA by/Fabricado en los EE.UU. por:  
**Elanco US Inc.**  
Winslow, Maine 04901 USA  
Phone 1-800-428-4441  
VLN/PCN 196/1045.02

AviPro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

# VACUNA CONTRA LA INFECCIÓN DE REOVIRUS AVIAR VIRUS INACTIVADO

*AviPro*<sup>™</sup> 106  
REO

1000 dosis - 500 mL

Solo para uso en animales

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 16 semanas de edad o mayores para proporcionar protección pasiva a la progenie contra el síndrome de malabsorción relacionado con el reovirus. La duración de la inmunidad para este producto no ha sido establecido. Para obtener más información sobre la eficacia y seguridad, diríjase a [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**Instrucciones de uso:** La vacuna debe calentarse a temperatura ambiente antes de su uso. Agitar bien antes y durante el uso. Inyectar subcutáneamente. Vacunar (previamente) con una vacuna a virus vivo contra tenosinovitis, por lo menos 4 semanas antes de usar esta vacuna. Vacunar entre las 16 y 20 semanas de edad. Revacunar 4 a 6 semanas después.

**Dosis:** 1/2 mL (0.5 mL) por ave. Inyectar todas las aves en la parvada. Contiene penicilina y estreptomycin como preservantes.

**Temperatura de almacenamiento:** Almacenar entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar.

**Advertencias:** En caso de exposición a humanos, contacte a un médico. No vacune dentro de los 42 días previos al sacrificio. Utilizar todo los contenidos una vez abierto. No mezclar con otros productos a excepción que sea indicado en el rotulado del producto.

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

