

DIRECTIONS FOR USE

FOWL LARYNGOTRACHEITIS VACCINE MODIFIED LIVE VIRUS

AviPro™
LT

For use in animals only

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 5 weeks of age or older against infectious laryngotracheitis. Duration of immunity has not been established for this product. For more information regarding efficacy and safety data, see productdata.aphis.usda.gov.

Administer by the intranasal or eye drop route (vials of 1000 doses only), or by coarse spray.

When administered to susceptible chickens, a mild form of the disease results, which stimulates immunity.

The need for revaccination has not been established; consultation with a veterinarian is recommended.

Eye drop or intranasal (nostril) administration:

For use with vials of 1000 doses only - rehydrate with 30 mL diluent provided. Remove overseal and stopper from the vaccine vial and pour part of the diluent into it. Shake well and pour the vaccine back into the remaining diluent. Place the dropper tip on the diluent bottle. The vaccine is now ready for eye drop or intranasal use.

For eye drop use, hold the bird on its side with one eye turned up. Administer one drop of vaccine into the open eye and hold the bird until it swallows. To prevent injury, avoid touching the bird's eye with the dropper tip.

For intranasal use, hold the bird's beak shut and place a finger over one nostril. Administer one drop of vaccine into the other nostril.

Coarse spray (aerosol) administration:

Rehydrate the vaccine with cool distilled water in an amount sufficient enough to vaccinate the required number of birds according to the directions of the spray cabinet or field spray manufacturer.

Field spray vaccination should be used only in houses that can be tightly closed. Close all windows, doors, vents, etc. and turn off fans. Spray each 1000 doses of vaccine directly into the faces of 1000 birds. Leave house closed for at least 15 minutes after spraying. Always use appropriate personal protective equipment during vaccination.

Storage temperature:

Store at 2° to 8°C (35° to 46°F).

Warnings:

Vaccinate only healthy birds.

If there are susceptible laying birds on the premises, there is the possibility that the virus might spread from the vaccinated to the susceptible birds and affect egg production.

Use entire contents when a vial is first opened.

Inactivate unused contents before disposal.

Do not mix with other products, except as specified on the labeling.

Keep permanent vaccination records, including vaccine serial number.

Do not vaccinate within 21 days before slaughter.

Contains penicillin and streptomycin as preservatives.

In case of human exposure, contact a physician.

Manufactured in the USA by:

Elanco US Inc.

Winslow, Maine 04901 USA

Phone 1-800-428-4441

VLN/PCN 196/1601.11

AviPro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

© 2021 Elanco or its affiliates

INSTRUCCIONES DE USO

VACUNA LARINGOTRAQUEITIS AVIAR VIRUS VIVO MODIFICADO

AviPro™
LT

Solo para uso en animales

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 5 semanas de edad o mayores contra la laringotraqueitis infecciosa. La duración de la inmunidad para este producto no ha sido determinada. Para obtener más información sobre la eficacia y seguridad, diríjase a productdata.aphis.usda.gov.

Administrar por vía intranasal o de la gota de ojos (viales de solo 1000 dosis), o por aerosol grueso.

Cuando se administra a pollos susceptibles, una forma leve de la enfermedad resulta, que estimula la inmunidad.

La necesidad de revacunación no ha sido establecida; se recomienda consultar a un médico veterinario.

Administración gota de ojos o intranasal (fosa nasal):

Para usar solo con viales de 1000 dosis, rehidratar con 30 mL diluyente proporcionado.

Retire el sello de seguridad y el tapón del vial de la vacuna y vierta parte del diluyente en ella. Agite bien y vierta la vacuna nuevamente en el resto diluyente. Coloque la punta del gotero en la botella de diluyente. La vacuna es ahora listo para la caída de los ojos o el uso intranasal.

Para el uso de gotas para los ojos, sostenga al ave de lado con un ojo hacia arriba. Administre una gota de vacuna en el ojo abierto y sostenga el ave hasta que se trague. Para evitar lesiones, evite tocar el ojo del ave con la punta del cuentagotas.

Para uso intranasal, mantenga el pico del ave cerrado y coloque un dedo sobre una fosa nasal. Administre una gota de vacuna en la otra fosa nasal.

Administración de aerosol grueso:

Rehidratar la vacuna con agua destilada fría en una cantidad suficiente para vacunar el número requerido de aves de acuerdo con el instrucciones del gabinete de pulverización o del fabricante del pulverizador de campo. La vacunación en aerosol de campo debe usarse solo en casas que pueden estar estrechamente cerrado. Cierre todas las ventanas, puertas, respiraderos, etc. y apague los ventiladores.

Rocíe cada 1000 dosis de vacuna directamente en las caras de 1000 aves.

Dejar la casa cerrado por al menos 15 minutos después de la pulverización. Siempre use apropiado equipo de protección personal durante la vacunación.

Temperatura de almacenamiento:

Almacenar entre 2° y 8°C (35° y 46°F).

Advertencias:

Vacunar solamente pollos sanos.

Si hay aves ponedoras susceptibles en las instalaciones, existe la posibilidad que el virus podría propagarse de las aves vacunadas a las aves susceptibles y afecta la producción de huevos.

Usar el contenido total una vez abierto el frasco.

Inactive todo el contenido no utilizado antes de desechar.

No mezclar con otros productos, excepto como se especifica en el rotulado de producto.

Mantener registros permanentes de vacunación, incluyendo el número de serie de la vacuna.

No vacune dentro de los 21 días previos al sacrificio.

Contiene penicilina y estreptomocina como conservantes.

En caso de exposición a humanos, contacte a un médico.

Fabricado en los EE.UU. por:

Elanco US Inc.

Winslow, Maine 04901 USA

Phone 1-800-428-4441

VLN/PCN 196/1601.11

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.