

VIL DU OPNÅ STABIL OG KONTINUERLIG KONTROL AF COCCIDIOSE?

Når du bruger Maxiban i kombination med Monteban giver det...

Nemmere at styre ift. shuttle-programmer



Stabil coccidiosekontrol

Tydeligt forbedrede produktionsresultater, som holder ved



Gevinst på 5 FCR-point¹

Stabil tarmsundheds-score

20 års succesfuld kontrol af coccidiose hos kyllinge-producenter i hele verden

Udvikling af erhvervet immunitet



Giver ekstra beskyttelse i tarmen



VÆLG DEN ANERKENDEDE LØSNING, SOM GIVER STABIL OG KONTINUERLIG KONTROL AF COCCIDIOSE

Elanco

Maxiban

Narasin + Nicarbazin

Elanco

Monteban

Narasin

Maxiban har vist bedre resultater end et tilsvarende monensin/nicarbazin program³

5,7% bedre FCR
7,5% større vækst
1,7% mere brystkød

Ved at bruge Maxiban i mindst 7 dage efter toppen af coccidiose **forbedres FCR med op til 0,23 point for hver ekstra dag**, hvilket slår alle andre ionoforprogrammer⁴

Brug **MAXIBAN** i kombination med **MONTEBAN** for at opnå en stabil kontrol af coccidiose

Kyllingeproducenter har i mere end 20 år oplevet og anerkendt produkternes evne til at beskytte imod coccidiose

Referencer: 1. For a company producing 100 million birds per year on a full Maxiban™ and Monteban™ programme compared to a Monensin/Nicarbazin and Salinomycin programme for 3 crops of the year. Elanco data on file REF-22071 2. Elanco, 2018: HTSi UK Data 2015-2018 / Performance data 2014-2018 – Tom Hepburn – EKS Specialist 3. Elanco Animal Health Study ELA1900304 2019. Data on file 4. FVEx data on file – 2011-2019

Monteban, Maxiban, Elanco og den diagonale streg er varemærker, som ejes af Elanco eller dets datterselskaber. © 2023. Elanco og dets datterselskaber. PM-DK-23-0193 09 2023

Elanco