



Gids voor een snelle start

Menginstructies:

- Meng 310 g (2 afgestreken 155 g schepjes) Tonistry Px met 10 liter vers water om een 3% vloeibare Tonistry Px oplossing te maken.
- Voor de beste resultaten, voeg Tonistry Px toe aan water en roer tot het poeder is opgelost.
- Maak dagelijks een verse oplossing en gebruik schone voerpannen voor de toediening.



Om nauwkeurig te mengen, gebruik het Tonistry Px schepje om het juiste volume poeder af te meten.



310g

+



10l

=



3%

Belangrijke punten

- Gebruik steeds vers drinkbaar water om de Tonistry Px oplossing te mengen.
- Meng slechts voldoende oplossing voor één voederbeurt per keer.
- Voeg het poeder toe aan het water (bij ongeveer 25°C) en roer zacht tot het volledig is opgelost door gebruik te maken van een garde of een gelijkaardige roerder.
- Gebruik geen heet water (boven 40°C).
- Was, spoel en ontsmet de gebruiksvoorwerpen na elke voederbeurt.





Tonisity Px Poeder

Vers Water

Tonisity Px Oplossing



Tonisity Px Oplossing

Droog Voer

Tonisity Px Brij

TIP:

Om de opname van de oplossing op dag 2 te bevorderen, doop de neus van enkele biggen in de oplossing. Zij zullen de andere biggen leren om te drinken.

1 Zuigende Biggen:

Van levensdag 2 tot en met 8, geef 500 ml Tonisity Px 3% oplossing per toom per dag (of 40 ml per big per dag).

2 Speenperiode:

Gedurende 3 dagen voorafgaand aan het spenen, geef 500 ml oplossing per toom per dag of 40 ml per big per dag boven op het brijvoer.

Gedurende 3 dagen na het spenen, geef tot 100 ml oplossing per big per dag boven op het brijvoer.

Voorzorgsmaatregelen

- Zorg ervoor dat de biggen altijd toegang hebben tot proper, vers water.
- Voor het voeren, zorg ervoor dat de voerpannen schoon zijn.
- Als er nog product overblijft in de voerpan na een halve dag en langer, voer dit dan aan de zeugen.
- Chloorbehandelingen van grondwater kunnen onregelmatig zijn. Een hoog chloorgehalte in het water zal de smaak van Tonisity Px negatief beïnvloeden.

Bewaarvoorschriften

- Bewaar het Tonisity Px poeder beneden 30°C (kamertemperatuur) in schone, droge omstandigheden.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht of vocht.
- Om de versheid te bewaren, houd gedeeltelijk gebruikte zakken goed gesloten na openen.

Voorzichtig handelen

De gebruiksaanwijzingen moeten goed opgevolgd worden. Tonisity Px is niet bestemd voor menselijke consumptie.

Meer info:

België:

https://farmanimal.elanco.com/nl_be

Nederland:

<https://farmanimal.elanco.com/nl>

BE: Elanco Belgium B.V. Generaal Lemanstraat 55/3, B-2018 Antwerpen, +32(0)3334 30 02, benelux@elancoah.com

NL: Elanco Nederland BV Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, +31(0)30 307 92 45, benelux@elancoah.com

Elanco

Elanco en het schuine balk logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen.

Tonisity Px is een handelsmerk van Tonisity Int. Ltd. © Elanco 2023