

PASTEURELLA MULTOCIDA BACTERIN AVIAN ISOLATES TYPES 1 & 4 & 3X4

AviPro™ 108 FC3 PLATINUM

2000 doses - 500 mL

For use in animals only

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 12 weeks of age or older against fowl cholera due to *Pasteurella multocida*, type 1.

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy turkeys 20 weeks of age or older against fowl cholera due to *Pasteurella multocida*, types 4 and 3X4.

Duration of immunity has not been established for this product. For more information regarding efficacy and safety data, see productdata.aphis.usda.gov.

Directions for use: Vaccine should be warmed to room temperature before use. Shake well before and during use. Inject subcutaneously or intramuscularly. Vaccinate chickens between 12 and 16 weeks of age. Vaccinate turkeys between 20 and 24 weeks of age. Revaccinate 4 to 6 weeks later.

Dose: 1/4 mL (0.25 mL) per bird. Inject all birds in flock.

Storage temperature: Store at 2° to 8°C (35° to 46°F). Do not freeze.

Warnings: In case of human exposure, contact a physician. May cause processing plant lesions when injected into turkey breast muscle. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Use entire contents when first opened. Do not mix with other products, except as specified on the labeling.

Manufactured in the USA/Fabricado en los EE.UU. por:
Elanco US Inc.
Winslow, Maine 04901 USA
Phone 1-800-428-4441
VLN/PCN 196/2703.19

AviPro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

BACTERINA PASTEURELLA MULTOCIDA AISLAMIENTOS AVIARES TIPOS 1 Y 4 Y 3X4

AviPro™ 108 FC3 PLATINUM

2000 dosis - 500 mL

Solo para uso en animales

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 12 semanas de edad o mayores contra la cólera aviar, causado por *Pasteurella multocida*, tipo 1.

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pavos sanos de 20 semanas de edad o mayores contra la cólera aviar, causado por *Pasteurella multocida*, tipos 4 y 3X4.

La duración de la inmunidad para este producto no ha sido determinada. Para obtener más información sobre la eficacia y seguridad, dirijase a productdata.aphis.usda.gov.

Instrucciones de uso: La vacuna debe calentarse a temperatura ambiente antes de su uso. Agitar bien antes y durante el uso. Inyectar por vía subcutánea o intramuscular. Vacunar pollos entre 12 y 16 semanas de edad. Vacunar pavos entre 20 y 24 semanas de edad. Revacunar 4 a 6 semanas mas tarde.

Dosis: 1/4 mL (0.25 mL) por ave. Inyectar todas las aves de la parvada.

Temperatura de almacenamiento: Almacenar entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar.

Advertencias: En caso de exposición a humanos, contacte a un médico. Cuando se inyecta en la pechuga de los pavos, puede ser causa de lesiones que se hacen aparentes en la planta de procesamiento. No vacune dentro de los 42 días previos al sacrificio. Utilizar todo los contenidos una vez abierto. No mezclar con otros productos a excepción que sea indicado en el rotulado del producto.

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

