



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Монтебан® 100.

(Организация-разработчик: Elanco Animal Health Incorporated, 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, USA / «Эланко Энимал Хэлс Инкорпорейтед», 2500 Инновэйшн Уэй, Гринфилд, штат Индиана, 46140, США)

Номер регистрационного удостоверения: 840-3-1.18-4030№ПВИ-3-2.9/02853

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Монтебан® 100 (Monteban® 100).

Международное непатентованное наименование: наразин.

2. Лекарственная форма: гранулы для орального применения.

Монтебан® 100 в 1 кг содержит действующее вещество наразин — 100 г и вспомогательные вещества: соевое или минеральное масло и оболочки рисовых зерен.

3. По внешнему виду препарат представляет собой гранулы серо-коричневого цвета. Срок годности лекарственного препарата — 2 года с даты производства. Не применять по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 25 кг в герметично закрытых многослойных бумажных мешках. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению на русском языке.

5. Хранить в закрытой упаковке производителя при температуре от 5°C до 25°C.

6. Хранить в недоступных для детей местах.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа — противококцидийные средства.

10. Монтебан® 100 относится к антикокцидийным лекарственным препаратам группы ионофоров. Активен в отношении внеклеточных бесполой форм (спорозоиты, мерозоиты) *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. necatrix*, *E. tenella*, паразитирующих у птиц. Антикокцидийное действие наразина, входящего в состав лекарственного препарата, обусловлено его воздействием на состояние калий-натриевого

равновесия и нарушением осмотического баланса в клетке паразита, что приводит к гибели кокцидий.

Наразин практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и проявляет свое кокцидиостатическое действие на слизистой и подслизистой оболочках кишечника. Выводится из организма птиц преимущественно в неизмененном виде с помётом.

По степени воздействия на организм Монтебан® 100 относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Монтебан® 100 применяют для профилактики кокцидиоза у цыплят-бройлеров.

12. Запрещается применение лекарственного препарата индейкам, яйценоской птице (куры несушки, ремонтному молодняку кур) и животным других видов.

13. При работе с Монтебан® 100 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Все работы необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

Во время работы запрещается пить, принимать пищу и курить. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки, рот прополоскать водой.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей. Упаковочный материал складировать в специально отведенных местах и утилизируют с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Монтебан® 100. При случайном попадании препарата на кожные покровы или в глаза, их необходимо промыть большим количеством проточной воды, при вдыхании препарата — следует вывести пострадавшего на свежий воздух. В случае развития аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Монтебан® 100 не предназначен для применения беременным и лактирующим животным.

15. Монтебан® 100 применяют цыплятам-бройлерам в смеси с кормом в дозе 0,7 кг на 1 тонну корма (70 г наразина на 1 тонну корма). Может применяться с первого дня жизни в течение всего периода выращивания. Исключают лекарственный препарат из рациона за 1 сутки до убоя.

Для обеспечения равномерного распределения суточную дозу Монтебан® 100 смешивают с небольшим количеством корма (20-50 кг) и затем, при тщательном перемешивании, вносят в корм, рассчитанный на потребление птицей в течение суток.

16. Побочных явлений и осложнений у птиц при применении препарата Монтебан® 100 в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается.

17. При передозировке препарата у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы тела.

18. Не допускается использование Монтебан® 100 одновременно с другими антикокцидийными средствами, совместно с тиамулином и тролеандомицином, а также за 7 суток до начала и в течение 7 суток после окончания их применения.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной дозы, применение препарата необходимо возобновить как можно скорее, в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой цыплят-бройлеров на мясо разрешается не ранее, чем через 1 сутки после окончания применения Монтебан® 100. Мясо птиц, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения:

Elanco Clinton Laboratories, 10500 South
State Road 63, Clinton, Indiana 47842-
0099, USA/ «Эланко Клинтон
Лэбораториз», 10500 Саут Стэйт Роуд
63, Клинтон, штат Индиана 47842-0099,
США.

Наименование, адрес
организации, уполномоченной
владельцем или держателем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на
принятие претензий от
потребителя:

ООО «Эланко Рус», 123112, Москва,
Пресненская набережная, д. 10, эт. 16,
пом. 1Б, ком. 13.

Специалист по регистрации
ООО «Эланко Рус»



Пьяных Е.М.

