

DIRECTIONS FOR USE

MYCOPLASMA GALLISEPTICUM VACCINE LIVE CULTURE

AviPro™
MG F

For use in animals only

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 12 weeks of age or older against *Mycoplasma gallisepticum*. Duration of immunity has not been established for this product. For more information regarding efficacy and safety data, see productdata.aphis.usda.gov. Administer in the drinking water. Vaccinate no later than 4 weeks prior to the onset of egg production.

The need for revaccination has not been established for this product; consultation with a veterinarian is recommended.

Drinking water administration:

Do not mix the vaccine until ready for use. Remove disinfectants, sanitizers and antimicrobials from the drinking water 24 hours before and after vaccination. Rinse all waterers with clean water. Mix vaccine in clean water which contains no disinfectants, sanitizers or antimicrobials. Add dry, fat free, powdered milk to the drinking water at the rate of ½ ounce per gallon or 2 grams per liter. Provide ample space for all birds to drink easily. Water containing vaccine should be consumed in 2 hours or less. To assure all birds drink, withhold water for 1 hour prior to vaccination. Administration through the water lines with a proportioner or medication tank is not recommended.

Storage temperature: Store at 2° to 8°C (35° to 46°F).

Warnings:

Vaccinate only healthy birds.
Use entire contents when a vial is first opened.
Inactivate unused contents before disposal.
Do not mix with other products, except as specified on the labeling.
Keep permanent vaccination records, including vaccine serial number.
Do not vaccinate within 21 days before slaughter.
Do not vaccinate turkeys.
Do not use antibiotics within 3 days before or after vaccination with this product.
Do not use Newcastle disease or infectious bronchitis vaccines within 7 days before or after vaccination with this product.
Avoid contact with vaccinated chickens.
Contains penicillin as a preservative.
In case of human exposure, contact a physician.
Distribution in each State shall be limited to authorized recipients designated by proper State officials--under such additional conditions as these authorities may require.

Manufactured in the USA by:
Elanco US Inc.
Winslow, Maine 04901 USA
Phone 1-800-428-4441
VLN/PCN 196/1751.00

AviPro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

© 2021 Elanco or its affiliates

INSTRUCCIONES DE USO

VACUNA MYCOPLASMA GALLISEPTICUM CULTIVO VIVO

AviPro™
MG F

Solo para uso en animales

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 12 semanas de edad o mayores contra *Mycoplasma gallisepticum*. La duración de la inmunidad para este producto no ha sido establecido. Para obtener más información sobre la eficacia y seguridad, diríjase a productdata.aphis.usda.gov. Administrar en el agua potable. Vacunar a más tardar 4 semanas antes del inicio de la producción de huevos.

La necesidad de revacunación no se ha establecido; se recomienda consultar con un veterinario.

Administración de agua potable:

No prepare la vacuna hasta que esté lista para su uso. Retire desinfectantes, higienizadores y antimicrobiales del agua potable 24 horas antes y después de la vacunación. Enjuague todos los bebederos con agua limpia. Mezcle la vacuna con agua limpia que no contenga agentes desinfectantes, higienizadores o antimicrobiales. Agregue leche en polvo, seca y sin grasa al agua potable a razón de ½ onza por galón o 2 gramos por litro. Provea amplio espacio para que todas las aves puedan beber fácilmente. El agua que contiene la vacuna debe ser consumida en 2 horas o menos. Para asegurarse que todas las aves beban, restrinja el agua por 1 hora antes de la vacunación. No se recomienda la administración a través de las líneas de agua utilizando un dosificador o tanque de medicación.

Temperatura de almacenamiento: Almacenar entre 2° y 8°C (35° y 46°F).

Advertencias:

Vacunar solamente pollos sanos.
Usar el contenido total una vez abierto el frasco.
Inactivar todo el contenido no utilizado antes de desechar.
No mezclar con otros productos, excepto como se especifica en el rotulado de producto.
Mantener registros permanentes de vacunación, incluyendo el número de serie de la vacuna.
No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio.
No vacunar pavos.
No usar antibióticos dentro de los 3 días anteriores o posteriores a la vacunación con este producto.
No usar las vacunas contra la enfermedad de Newcastle o bronquitis infecciosa dentro de los 7 días anteriores o posteriores a la vacunación con este producto.
Evitar el contacto con pollos vacunados.
Contiene penicilina como preservante.
En caso de exposición a humanos, contacte a un médico.
La distribución en cada Estado se limitará a los destinatarios autorizados designados por los funcionarios Estatales adecuados--según las condiciones adicionales que estas autoridades puedan requerir.

Fabricado en los EE.UU. por:
Elanco US Inc.
Winslow, Maine 04901 USA
Teléfono 1-800-428-4441
VLN/PCN 196/1751.00

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

