

1000 dosis  
500 mL

1000 doses  
500 mL

**BURSAL DISEASE-  
REOVIRUS VACCINE  
STANDARD AND VARIANT  
KILLED VIRUS**

**VACUNA CONTRA  
LA ENFERMEDAD  
INFECCIOSA DE LA BOLSA  
Y LA INFECCIÓN DE REOVIRUS AVIAR  
ESTANDARE Y VARIANTE  
VIRUS INACTIVADO**

*AviPro*<sup>™</sup> 226  
BTO2-REO

**1000 doses - 500 mL / 1000 dosis - 500 mL**  
For use in animals only / Solo para uso en animales

AviPro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.  
AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 12 semanas de edad o mayores contra la variante AL-2 de la enfermedad infecciosa de la bolsa, y proporciona protección pasiva a la progenie contra el síndrome de malabsorción y tenosinovitis relacionada con el reovirus y la enfermedad infecciosa de la bolsa tipo 1, cepas estándar y variantes. La duración de la inmunidad para este producto no ha sido establecido. Para obtener más información sobre la eficacia y seguridad, diríjase a [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov). La protección de la progenie contra la variante AL-2 no ha sido determinada.

**Instrucciones de uso:** La vacuna debe calentarse a temperatura ambiente antes de su uso. Agitar bien antes y durante el uso.

Injectar subcutáneamente.

Vacunar (previamente) con vacunas de virus vivo contra la enfermedad infecciosa de la bolsa y tenosinovitis, por lo menos 4 semanas antes de usar esta vacuna.

Vacunar entre las 12 y 20 semanas de edad.

La necesidad de una revacunación anual no ha sido establecida para este producto. Se recomienda consultar a su médico veterinario tratante.

**Dosis:** 1/2 mL (0.5 mL) por ave. Injectar todas las aves en la parvada.

Contiene penicilina y estreptomycin como preservantes.

**Temperatura de almacenamiento:** Almacenar entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar.

**Advertencias:** En caso de exposición a humanos, contacte a un médico. No vacune dentro de los 42 días previos al sacrificio. Utilizar todo los contenidos una vez abierto. No mezclar con otros productos a excepción que sea indicado en el rotulado del producto.

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 12 weeks of age or older against the AL-2 variant of infectious bursal disease, and to provide passive protection of progeny against reovirus-related malabsorption syndrome and tenosynovitis and type 1 infectious bursal disease, standard and variant strains. Duration of immunity has not been established for this product. For more information regarding efficacy and safety data, see [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov). Protection of progeny against the AL-2 variant has not been demonstrated.

**Directions for use:** Vaccine should be warmed to room temperature before use. Shake well before and during use.

Inject subcutaneously.

Vaccinate (prime) with live virus vaccines for infectious bursal disease and tenosynovitis at least 4 weeks prior to the use of this vaccine. Vaccinate between 12 and 20 weeks of age.

A revaccination schedule has not been established for this product; consultation with a veterinarian is recommended.

**Dose:** 1/2 mL (0.5 mL) per bird. Inject all birds in flock.

Contains penicillin and streptomycin as preservatives.

**Storage temperature:** Store at 2° to 8°C (35° to 46°F). Do not freeze.

**Warnings:** In case of human exposure, contact a physician. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Use entire contents when first opened. Do not mix with other products, except as specified on the labeling.

Manufactured in the USA by/Fabricado en los EE.UU. por:

**Elanco US Inc.**

Winslow, Maine 04901 USA

Phone 1-800-428-4441

VLN/PCN 196/12D5.04

**Elanco**<sup>™</sup>