

DIRECTIONS FOR USE

BRONCHITIS VACCINE ARK. TYPE, LIVE VIRUS

AviPro™
IB ARK

For use in animals only

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 1 day of age or older against infectious bronchitis, Ark. type. Duration of immunity has not been established for this product. For more information regarding safety and efficacy data, see productdata.aphis.usda.gov.

Administer by the eye drop route (vials of 1000 doses only), or by coarse spray.

A second dose should be given at 2 weeks of age or older.

Eye drop administration:

For use with vials of 1000 doses only - rehydrate with 30 mL diluent provided.

Remove overseas and stopper from the vaccine vial and pour part of the diluent into it. Shake well and pour the vaccine back into the remaining diluent. Place the dropper tip on the diluent bottle. The vaccine is now ready for eye drop use. Hold the bird on its side with one eye turned up. Administer one drop of vaccine into the open eye and hold the bird until it swallows. To prevent injury, avoid touching the bird's eye with the dropper tip.

Coarse spray administration:

Rehydrate the vaccine with cool distilled water in an amount sufficient enough to vaccinate the required number of birds according to the directions of the spray cabinet or field sprayer manufacturer. Field spray application should be used only in houses that can be tightly closed. Close all windows, doors, vents, etc. and turn off fans. Spray each 1000 doses of vaccine directly into the faces of 1000 birds. Leave house closed for at least 15 minutes after spraying. Always use appropriate personal protective equipment during vaccination.

Vaccination reaction:

Respiratory symptoms will be more pronounced from the first vaccination and will vary with the age and the level of parental immunity in the chicks. While birds are going through the reaction period, keep them comfortable by providing adequate heat and ventilation.

Storage temperature: Store at 2° to 8°C (35° to 46°F).

Warnings:

Vaccinate only healthy birds.

Use entire contents when a vial is first opened.

Inactivate unused contents before disposal.

Do not mix with other products, except as specified on the labeling.

Keep permanent vaccination records, including vaccine serial number.

Do not vaccinate within 21 days before slaughter.

Contains penicillin and streptomycin as preservatives.

In case of human exposure, contact a physician.

Distribution in each State shall be limited to authorized recipients designated by proper State officials--under such additional conditions as these authorities may require.

Chicks being shipped by parcel post should be vaccinated at their destination so as not to violate postal regulations.

Manufactured in the USA by:

Elanco US Inc.

Winslow, Maine 04901 USA

Phone 1-800-428-4441

VLN/PCN 196/1231.20

AviPro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

© 2021 Elanco or its affiliates

INSTRUCCIONES DE USO

VACUNA CONTRA LA BRONQUITIS INFECCIOSA TIPO ARK., VIRUS VIVO

AviPro™
IB ARK

Solo para uso en animales

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 1 día de edad o mayores contra la bronquitis infecciosa, el tipo de Ark. La duración de la inmunidad para este producto no ha sido establecido. Para obtener más información sobre la eficacia y seguridad, diríjase a productdata.aphis.usda.gov. Administrar para la ruta de la gota de ojos (viales de solo 1000 dosis), o de aspersión gruesa.

Se debe administrar una segunda dosis a las 2 semanas de edad o mayores.

Administración gota de ojos:

Para usar solo con viales de 1000 dosis - rehidratar con 30 mL diluyente proporcionado.

Retire el sello de seguridad y el tapón del vial de la vacuna y vierta parte del diluyente en ella. Agite bien y vierta la vacuna nuevamente en el resto diluyente. Coloque la punta del gotero en la botella de diluyente. La vacuna es ahora listo para la caída de los ojos.

Para el uso de gotas para los ojos, sostenga al ave de lado con un ojo hacia arriba. Administre una gota de vacuna en el ojo abierto y sostenga el ave hasta que se trague. Para evitar lesiones, evite tocar el ojo del ave con la punta del cuentagotas.

Administración de aspersión gruesa:

Rehidratar la vacuna con agua destilada fría en una cantidad suficiente para vacunar el número requerido de aves de acuerdo con el instrucciones del gabinete de pluvización o del fabricante del pulverizador de campo. La vacunación en aerosol de campo debe usarse solo en casas que puedan estar estrechamente cerrado. Cierre todas las ventanas, puertas, respiraderos, etc. y apague los ventiladores. Rocíe cada 1000 dosis de vacuna directamente en las caras de 1000 aves. Deje la casa cerrado por al menos 15 minutos después de la pulverización. Siempre use apropiado equipo de protección personal durante la vacunación.

Reacción a la vacunación:

Los sinotomas respiratorios son más pronunciados después de la primer vacuna y varían de acuerdo a la edad y nivel de inmunidad paterna en los pollitos. A través del periodo de reacción, mantenga las aves cómodas suministrándoles calor adecuado y buena ventilación.

Temperatura de almacenamiento: Almacenar entre 2° y 8°C (35° y 46°F).

Advertencias:

Vacunar solamente pollos sanos.

Usar el contenido total una vez abierto el frasco.

Inactive todo el contenido no utilizado antes de desechar.

No mezclar con otros productos, excepto como se especifica en el rotulado de producto.

Mantener registros permanentes de vacunación, incluyendo el número de serie de la vacuna.

No vacune dentro de los 21 días previos al sacrificio.

Contiene penicilina y estreptomycin como preservativos.

En caso de exposición a humanos, contacte a un médico.

La distribución en cada estado se limitará a los destinatarios autorizados designados por los funcionarios estatales adecuados--según las condiciones adicionales que estas autoridades puedan requerir.

Los polluelos enviados por paquete postal deben vacunarse en su destino para no violar las regulaciones postales.

Fabricado en los EE.UU. por:

Elanco US Inc.

Winslow, Maine 04901 USA

Teléfono 1-800-428-4441

VLN/PCN 196/1231.20

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

Elanco™