

Monteban™ 45

TM

Net Weight **25 kg**

(55.12 lb)

(narasin Type A medicated article)**For Use in Broiler Chicken Feeds Only****Do Not Feed Undiluted.**

Active Drug Ingredient: narasin 45 g per lb
 For the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati*, and *E. maxima*.

Important: Must be thoroughly mixed in feeds before use.**Mixing Directions:**

Type C Feeds - Amounts of Monteban 45 necessary to manufacture one ton of Type C medicated feed containing 54 to 90 g narasin are shown in the table. A preblend of Monteban in 15 - 20 lbs of feed should be made before incorporating into the total amount of finished Type C medicated feed.

The drug concentration should be adjusted to meet the severity of the coccidial challenge, which varies with environmental and management conditions.

Narasin Type C Concentration (Grams/Ton)	Monteban (Lbs/Ton of Type C Feed)
54	1.20
59	1.31
63	1.40
68	1.51
72	1.60
81	1.80
90	2.00

Type B Feeds - Amounts of Monteban 45 necessary to manufacture one ton of Type B medicated feed containing up to 5,400 g narasin are shown in the table.

Narasin Type B Concentration (Grams/Ton)	Monteban (Lbs/Ton of Type B feed)
1,350	30
2,700	60
5,400	120

Feeding Directions – Feed the resulting Type C medicated feed continuously as the sole ration.

CAUTION: Do not allow adult turkeys, horses or other equines access to narasin formulations. Ingestion of narasin by these species has been fatal.

NOT FOR HUMAN USE

WARNING: When mixing and handling Monteban, use protective clothing, impervious gloves and a dust mask. Operators should wash thoroughly with soap and water after handling. If accidental eye contact occurs, immediately rinse thoroughly with water.

Store at or below 25 °C (77 °F). Excursions permitted to 37 °C (99 °F).

Not to be used after the date printed at top of bag.

Monteban, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

Restricted Drug (California) - Use Only as Directed

Approved by FDA under NADA # 118-980

Elanco US Inc.
Greenfield, IN 46140, USA

To report adverse effects,
access medical information,
or obtain additional
product information,
call 1-800-428-4441.

**Monteban™ 45**

TM

Peso Neto: **25 kg**

(55.12 libras)

(narasina Artículo medicado tipo A)**Solo para uso en alimento para pollos de engorde****No administrar sin diluir**

Principio activo: narasina..... 100 g/kg (45 g/lb)

Para la prevención de la coccidiosis causada por *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati* y *E. maxima*.

Importante: Debe mezclarse bien con el alimento antes de usar.

Instrucciones de mezclado:

Alimentos tipo C: En la tabla se muestran las cantidades de Monteban 45 necesarias para elaborar una tonelada corta de alimento tipo C medicado que contenga de 54 a 90 g de narasina. Se recomienda hacer una premezcla de Monteban en 7 a 10 kg (15 a 20 lb) de alimento antes de incorporarla a la cantidad total del alimento medicado tipo C terminado. La concentración del fármaco debe ajustarse de acuerdo con la gravedad de la infestación coccidial, que varía con las condiciones medioambientales y de manejo.

Narasina en concentración para alimentos tipo C (g/ton corta)	Monteban (lb/ton corta de alimento tipo C)	Narasina (g/ton métrica)	Monteban (kg/ton métrica)
g	lb	g	kg
54	1.20	60	0.600
59	1.31	65	0.650
63	1.40	70	0.700
68	1.51	75	0.750
72	1.60	80	0.800
81	1.80	90	0.900
90	2.00	100	1.000

Alimentos tipo B: En la tabla se muestran las cantidades de Monteban 45 necesarias para elaborar una tonelada corta de alimento medicado tipo B con un contenido de hasta 5,400 g de narasina.

Narasina en concentración para alimentos tipo B (g/ton corta)	Monteban (lb/ton corta de alimento tipo B)	Narasina (g/ton métrica)	Monteban (kg/ton métrica)
1,350	30	1,500	15.0
2,700	60	3,000	30.0
5,400	120	6,000	60.0

Instrucciones de administración: Administrar el alimento medicado tipo C resultante de manera continua como la única ración.

PRECAUCIÓN: No permita que pavos adultos, caballos u otros equinos tengan acceso a formulaciones con narasina. La ingestión de narasina por estas especies ha sido mortal.

NO USAR EN SERES HUMANOS

ADVERTENCIA: Cuando se mezcle o manipule Monteban use ropa protectora, guantes impermeables y mascarilla contra polvo. Los operarios deben lavarse bien con agua y jabón tras manipular el producto. Si ocurre contacto accidental con los ojos, se deberán enjuagar inmediatamente con agua abundante.

Consevar a una temperatura igual o menor a 25 °C (77 °F). Se permiten variaciones hasta 37 °C (99 °F). No se deberá usar después de la fecha impresa en la parte superior del saco.

Monteban, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

Medicamento Restringido (California) - Usar solo según las indicaciones - Aprobado por la FDA bajo NADA # 118-980

Elanco US Inc.
Greenfield, IN 46140,
Estados Unidos de América

Para notificar de efectos adversos, tener acceso a información médica u obtener información adicional sobre el producto, llame al 1-800-428-4441.