

# AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM BACTERIN

## AviPro™ 101 CORYZA GOLD

For use in animals only

**1000 dosis - 500 mL**

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 5 weeks of age or older against infectious coryza due to *Avibacterium paragallinarum*. Duration of immunity has not been established for this product. For more information regarding efficacy and safety data, see [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**Directions for use:** Vaccine should be warmed to room temperature before use. Shake well before and during use. Inject subcutaneously.

Vaccinate chickens between 5 and 9 weeks of age. Revaccinate at least 4 weeks after the initial vaccination, but no later than 4 weeks prior to onset of lay.

**Dose:** 1/2 mL (0.5 mL) per bird. Inject all birds in flock.

**Storage temperature:** Store at 2° to 8°C (35° to 46°F). Do not freeze.

**Warnings:** In case of human exposure, contact a physician. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Use entire contents when first opened. Do not mix with other products, except as specified on the labeling.

Manufactured in the USA by/  
Fabricado en los EE.UU. por:

**Elanco US Inc.**

Winslow, Maine 04901 USA  
Phone 1-800-428-4441  
VLN/PCN 196/2658.12

AviPro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

# BACTERINA AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM

## AviPro™ 101 CORYZA GOLD

Solo para uso en animales

**1000 doses - 500 mL**

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 5 semanas de edad o mayores contra la coriza infecciosa causado por *Avibacterium paragallinarum*. La duración de la inmunidad para este producto no ha sido determinada. Para obtener más información sobre la eficacia y seguridad, diríjase a [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**Instrucciones de uso:** La vacuna debe calentarse a temperatura ambiente antes de su uso. Agitar bien antes y durante el uso.

Inyectar subcutáneamente.

Vacunar pollas entre las 5 y 9 semanas de edad.

Revacuna al menos 4 semanas después de la vacunación inicial, pero a más tardar 4 semanas antes del inicio de la puesta.

**Dosis:** 1/2 mL (0.5 mL) por ave. Inyectar todas las aves de la parvada.

**Temperatura de almacenamiento:** Almacenar entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar.

**Advertencias:** En caso de exposición a humanos, contacte a un médico. No vacune dentro de los 42 días previos al sacrificio. Utilizar todo los contenidos una vez abierto. No mezclar con otros productos a excepción que sea indicado en el rotulado del producto.

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.