

ПРОТОКОЛ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ ФОРМИ ДИРОФІЛЯРІОЗУ У СОБАК

Elanco

У собак, у котрих підтверджено дирофіляріоз на підставі позитивного тесту на антиген (АГ) та мікрофілярії (МФ) АБО при наявності мікрофілярій та негативного тесту на антиген:

- проведіть повторний тест на АГ, використовуючи тест-системи іншого типу або іншого виробника;
- повторно проведіть тест із попередньо підігрітою сироваткою (тільки у випадках із високою ймовірністю дирофіляріозу).

1 Адвокат для собак або Кределію Плюс щомісяця для профілактики дирофіляріозу:

- якщо виявлено МФ, тоді перед першою обробкою макролідами рекомендовано використання глюкокортикостероїдів;
- спостерігайте за реакцією щонайменше 8 год.

2 Доксциклін 10 мг/кг 2 рази на день протягом 28 днів:


- зменшує популяцію вольбахій (бактерій-ендосимбіонтів);
- зменшує ускладнення, пов'язані з гибеллю дирофілярій.

3 Обмеження активності — чим більше виражені ознаки, тим жорсткіше обмеження.


4 Адвантікс для захисту від укусів комарів.

Якщо собака має клінічні симптоми, тоді на додаток до перерахованих вище пунктів:

- Стабілізація за допомогою відповідної терапії.
- Преднізолон із поступовим зниженням дози - 0,5 мг/кг 2 рази на день 1-й тиждень, 0,5 мг/кг 2-й тиждень, 0,5 мг/кг через день протягом 3-го і 4-го тижнів.



Розмір 20-36 см*



Dirofilaria immitis



Мікрофілярії

Advocate®

Credelio™ PLUS

Advantix®

30
ДНІВ

Комунікація з власником, щоб переконатися щодо:

1. Завершення повного курсу доксицикліну.
2. Щомісячного застосування **Адвокат для собак** або **Кределіо Плюс** для профілактики дирофіляріозу.
3. Застосування **Адвантікс** для захисту від укусів комарів.

31 – 59 дні

Рекомендовано 1 місяць очікування після застосування доксицикліну перед введенням меларсоміну.

60
ДНІВ

Адвокат для собак або Кределіо Плюс щомісяця для профілактики

1. 1-ша (з 3-х) ін'єкція меларсоміну 2,5 мг/кг внутрішньом'язово (в/м).
 - а) моніторинг стану після ін'єкції;
 - б) контроль болю.
2. Преднізолон із поступовим зниженням дози - 0,5 мг/кг 2 рази на добу 1-й тиждень, 0,5 мг/кг 2-ий тиждень, 0,5 мг/кг через день 3-ій і 4-ий тижні.
3. Суворе обмеження активності (або продовжувати, якщо розпочато в день 0) - використання клітки.
4. **Адвантікс** для захисту від укусів комарів.



Матеріал створено за редакцією
Аліни Годованюк,

Керівника відділення терапії, провідного
терапевта, пульмонолога ветеринарної
клініки «Зоолукс»

90
ДНІВ

Адвокат для собак або Кределіо Плюс щомісяця для профілактики дирофіляріозу.

1. Введення 2-гої (з 3-х) ін'єкції меларсоміну, 2,5 мг/кг в/м.
 - а) моніторинг стану;
 - б) контроль болю.
2. Преднізолон із поступовим зниженням дози - 0,5 мг/кг 2 рази на добу 1-й тиждень, 0,5 мг/кг 2-ий тиждень, 0,5 мг/кг через день протягом 3-го і 4-го тижнів.
3. **Адвантікс** для захисту від укусів комарів.

91 день

1. Введення 3-ої (з 3-х) ін'єкції меларсоміну, 2,5 мг/кг в/м в протилежний м'яз (відносно місця введення 2-ої ін'єкції).
 - а) моніторинг стану;
 - б) контроль болю.
2. Продовження суворого обмеження активності протягом наступних 6-8 тижнів.

120
ДНІВ

Адвокат для собак або Кределіо Плюс щомісяця для профілактики дирофіляріозу.

1. Кількісний тест (модифікований метод Кнотта) на наявність мікрофілярій незалежно від статусу мікрофіляремії у пацієнта на день 0.
- у разі позитивного результату - обробка мікрофілярицидом **Адвокат для собак** і повторні тестування кожні 4 тижні, доки результат не буде негативний.
2. **Адвокат для собак** або **Кределіо Плюс** щомісячно цілорічно для профілактики дирофіляріозу, а також **Адвантікс** для захисту від укусів комарів.
3. Поступове повернення до активності протягом наступних 4-х тижнів.

365
ДНІВ

Відновити щорічний скринінг дирофіляріозу (9 місяців після останньої ін'єкції меларсоміну):

- тест на антиген;
- тест на мікрофілярії.

У разі позитивного результату на АГ повторити лікування доксицикліном протягом 28 днів з наступними 2 ін'єкціями (по 2,5 мг/кг в/м) меларсоміну з інтервалом 24 години:

- моніторинг стану після ін'єкції;
- контроль болю.

Преднізолон із поступовим зниженням дози - 0,5 мг/кг 2 рази на добу 1-ий тиждень, 0,5 мг/кг 2-ий тиждень, 0,5 мг/кг через день - 3-ій і 4-ий тижні.

Суворе обмеження активності протягом 6-8 тижнів.