



Credelio 12 mg Reg. Q-0715-250

Credelio 48 mg Reg. Q-0715-249

FICHA TÉCNICA

Desparasitante externo oral de acción sistémica para el tratamiento de pulgas y garrapatas en gatos.

FÓRMULA

Credelio 12 mg

Cada tableta de Credelio 12 mg contiene:

Lotilaner.....12 mg

Excipientes c.s.p50.5 mg

Credelio 48 mg

Cada tableta de Credelio 48 mg contiene:

Lotilaner.....48 mg

Excipientes c.s.p202.1 mg

TIPO DE FORMULACIÓN: Tabletas saborizadas

INGREDIENTE ACTIVO: Lotilaner

MODO DE ACCIÓN

Lotilaner, es un enantiómero puro de la clase isoxazolina, activo contra pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) y garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*).

Lotilaner es un potente inhibidor de los canales de cloruro activados por el ácido gamma-aminobutírico (GABA), lo que provoca la muerte rápida de pulgas y garrapatas. En estudios in vitro, la actividad de lotilaner contra algunas especies de artrópodos no se vio afectada por la resistencia a organoclorados (ciclodienos, por ejemplo, dieldrina), fenilpirazoles (por ejemplo, fipronil), neonicotinoides (por ejemplo, imidacloprid), formamidinas (por ejemplo, amitraz) y piretroides (por ejemplo, cipermetrina)

En el caso de pulgas, las pulgas existentes en el animal mueren en el término de 8 horas después de la administración del producto. Durante todo un mes, en el caso de nuevas infestaciones, las pulgas son eliminadas en el término de 12 horas.

En el caso de las garrapatas, las garrapatas ya existentes en los gatos mueren dentro de 18 horas después de la administración del producto. En el caso de nuevas infestaciones, las garrapatas son eliminadas en el término de 24 horas.

Credelio mata las pulgas ya existentes y las recién emergidas antes de que puedan poner huevos. Por ende, el producto rompe el ciclo de vida de las pulgas y previene la contaminación ambiental con pulgas en las áreas de acceso de los gatos.

Después de la administración oral, el lotilaner se absorbe fácilmente y la concentración máxima en sangre se alcanza a las 4 horas. Lotilaner es aproximadamente 10 veces más biodisponible cuando se administra con alimentos. La vida media terminal es de aproximadamente 4 semanas (media armónica). Esta vida media terminal proporciona concentraciones sanguíneas eficaces durante todo el periodo de intervalo entre dosis.

La ruta principal de eliminación es la excreción biliar y la excreción renal es la ruta menor de eliminación (menos del 10% de la dosis). Lotilaner se metaboliza en pequeña medida a compuestos más hidrófilos, que se observan en las heces y la orina.

INDICACIONES

Felinos domésticos: Para su uso en gatos y gatitos a partir de las 8 semanas de edad y 0.5 kg de peso, para el tratamiento y prevención de infestaciones de pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*).

Para su uso en gatos y gatitos a partir de los 6 meses de edad y 0.5 kg de peso, para el tratamiento y control de infestaciones de garrapatas (*Ixodes ricinus* y *I. scapularis*).

Credelio puede ser usado como parte de la estrategia del tratamiento de la Dermatitis Alérgica a la Picadura de la Pulga (DAPP).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vía de administración: CREDELIO es una tableta saborizada para administración por vía oral.

Dosis para felinos domésticos:

CREDELIO debe ser administrado a una dosis 6 a 24 mg de lotilaner por kg de peso corporal acorde a la siguiente tabla:

| Peso del GATO | Número de tabletas a administrar | |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| | CREDELIO 12 mg | CREDELIO 48 mg |
| 0.5 – 2.0 kg | 1 | |
| >2.0 – 8.0 kg | | 1 |
| >8.0 kg | Combinación apropiada de tabletas | |

Para gatos de más de 8 kg de peso corporal, utilice una combinación adecuada de las tabletas disponibles para conseguir la dosis recomendada de 6 a 24 mg/kg.

Administre CREDELIO una vez al mes con comida o dentro de los 30 minutos después de la comida.

CONTRAINDICACIONES

No usar en casos de hipersensibilidad al ingrediente activo o alguno de los excipientes.

USO EN ANIMALES DURANTE LA GESTACION Y LACTANCIA

Los estudios de laboratorio efectuados en ratas no han demostrado efectos teratogénicos ni evidencia de cualquier efecto adverso en la capacidad reproductiva de machos y hembras. No se ha evaluado la seguridad de lotilaner en gatos gestantes, lactantes o reproductores. Su uso en estos animales deberá ser evaluado por el médico veterinario responsable de acuerdo al riesgo/beneficio.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

Para reducir al mínimo la probabilidad de re-infestación de pulgas, es importante tratar a todos los animales dentro del hogar con un producto aprobado que proteja contra la pulga.

Por el rápido inicio del efecto garrapaticida de CREDELIO, se reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas. No obstante, los parásitos necesitan empezar a alimentarse en el huésped para ser expuestos al ingrediente activo lotilaner; por consiguiente, el riesgo de una transmisión de enfermedades por estos parásitos no puede ser excluida completamente.

Todos los datos de eficacia y seguridad han sido obtenidos con gatitos y gatos de 8 semanas de edad o más y de 0.5 kg de peso o más. El uso de Credelio en gatitos menores de 8 semanas de edad o de menos de 0.5 kg de peso deberá basarse en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Dado que no existen datos suficientes para confirmar la eficacia contra las garrapatas en gatitos, no se recomienda este producto para el tratamiento de las garrapatas en animales menores de 6 meses de edad..



REACCIONES ADVERSAS

Se ha reportado vómito en muy raras ocasiones. Este signo suele resolverse sin tratamiento. Alteraciones neurológicas como temblores, ataxia o convulsiones pueden ocurrir en muy raras ocasiones.

ANTÍDOTOS

No se conoce antídoto específico para la pradofloxacin (u otras fluoroquinolonas), por lo que debe administrarse un tratamiento sintomático en caso de sobredosificación.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

Ninguna conocida. Durante los ensayos clínicos no se observaron interacciones entre Credelio y medicamentos veterinarios de uso rutinario.

SOBREDOSIFICACIÓN

Durante la administración oral a gatitos de 8 semanas de edad y con un peso corporal de 0.5 kg, tratados en ocho ocasiones en intervalos mensuales con 130 mg lotilaner/kg de peso corporal (corresponde a más de 5 veces la dosis máxima recomendada) no se observaron reacciones adversas.

ADVERTENCIAS AL USUARIO

No para uso en humanos. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Lávese las manos después de manipular el producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el inserto o la caja.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en su envase original a temperatura no mayor de 30°C.

USO VETERINARIO

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Elanco Salud Animal, S.A. de C.V.
Boulevard Puerta de Hierro No.5153,
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,
Zapopan C.P.45116,Jalisco.
Tel.:800 000 7387
e-mail: saclatam@elancoah.com