

エルーラ™



詳しくは当院にご相談ください。



PM-JP-24-0307-PC

エルーラ™




エルーラ™を使用される
飼い主さまへ

エルーラ™は獣医師の指示により処方されるお薬です。

Elanco

エルーラ™ は、慢性疾患の猫ちゃんの食欲を増進し、代謝変化をサポートすることで体重を増加させるお薬です。



●慢性疾患では…

様々な慢性疾患(慢性腎臓病など)が原因となり、食欲が落ちたり体重が減少することがあります。特に、代謝が変化して筋肉量が減少すると、日常生活に支障が出たり、病気の進行にも関連するなどの悪影響が生じます。^{1,2)}

エルーラ™ は、栄養摂取と代謝をサポートすることで慢性疾患の猫ちゃんの体重を増加させQOL(生活の質)の向上に貢献します。

1)Freeman LM. 2012. J Vet Intern Med. 26(1): 3-17 2)Freeman LM et al. 2016. J Vet Intern Med. 30(5): 1661-1666



エルーラ™ のはたらき

エルーラ™ は、生体内で働く食欲ホルモン(グレリン)と同様の作用をもつお薬です。猫ちゃんに投与することで、

- ①食欲中枢を刺激し、**食欲を増進します。**
- ②成長ホルモンの分泌を促すことで、**筋肉をつくる手助けをし、体重を増加させます。**

エルーラ™ の特長



猫ちゃんへの投与の
しやすさに配慮した
バニラフレーバー付きの
経口液剤です。



長期投与における安全性が
確認されており、
毎日の治療に安心して
ご使用いただけます。

エルーラ™の使い方

- ▶ 1日1回、同じ時間帯に投与します。
- ▶ 先生から指示された量を投与してください。
- ▶ お薬は直接口の中に入れて飲ませてください。難しい場合は、獣医師にご相談ください。
- ▶ お食事と一緒に投与することもできます。
その場合は、少量の食事と混ぜて全量が飲めたことを確認してください。




▶ 1日1回 朝 昼 夜

▶ 投与量: のメモリまで
(mL)

▶ 次回の診察予定日:

年 月 日



適切なメモリの位置を記入してください。

※メモリは、お薬の容量(mL)を示しています。

投与後の反応

エルーラ™投与後、約2割の猫ちゃんによだれが多く分泌されることが確認されています。


これは、お薬の作用による生理的な反応と考えられます。

よだれの分泌は**ほとんどが一過性**で、通常お薬の投与直後からみられ数分で回復し、投与を続けていると**1〜3日間程度でおさまる**ことが知られています。

よだれの分泌が改善しない場合は、獣医師にご相談ください。


投与方法

- 1 ボトルキャップを押し込んだまま回して開けます。




※小児の誤飲防止のため、回すだけではボトルキャップは開きません。

- 2 シリンジの先端をボトルの口にしっかりと差し込みます。



※シリンジの内筒が下までしっかり押し込まれていることを確認してください。


- 3 シリンジを差し込んだままボトルを逆さまにし、傾けて、先生から指示された量の薬剤を吸い取ります。



- 5 シリンジの内筒をゆっくり押ししながら、薬剤を猫の口の中に直接入れて飲ませます。



- 4 ボトルを立てた状態に戻し、シリンジをねじってボトルから外します。



- 6 投与後はボトルのキャップをしっかりと閉めてください。シリンジと内筒を水道水で洗って乾燥させ、ボトルと一緒に保管してください。



※ボトルは室温(1〜30℃)で保管してください。

獣医師と相談しながら 治療を続けていきましょう

定期的に受診しましょう

お薬の効果や体調の変化がないかなどを確認するために、定期的に検診を受けましょう。
エルーラ™は、慢性疾患の管理と合わせて投与を続けていきましょう。

お家での猫ちゃんの様子をよく観察しましょう

食欲や食べたもの、食事量など、お家での様子を獣医師に伝えられると、治療経過の把握に役立ちます。また、お家でも定期的に体重を測定してみましょう。
右ページの体重・食欲チェック表➡もご活用ください。

食欲増進のコツ


エルーラ™を使用する以外にも、

- ▶ フードを温める
- ▶ 食器を工夫する（広くて浅いお皿にする、材質を変えてみる、食べやすい高さにする、場所を変えてみるなど）
- ▶ ストレスのない環境にする

などで食欲が増すこともあります。
適切なフードの種類や与えてもいい食べ物については、獣医師に相談してみましょう。

体重の測り方

お家で体重を測る際は、猫ちゃんを抱っこして体重計に乗り、そのあとでご自身の体重を引いて計算する方法が簡単です。
続けて体重が減っている場合は、早めに獣医師に相談しましょう。



体重・食欲チェック表

ちゃん

エルーラ™を投薬した日や、食事量、体重の変化を記録しましょう。

1週目 体重 _____ kg

日付	投薬	食事量				
		少	普通	多		
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5

2週目 体重 _____ kg

日付	投薬	食事量				
		少	普通	多		
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5

3週目 体重 _____ kg

日付	投薬	食事量				
		少	普通	多		
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5

4週目 体重 _____ kg

日付	投薬	食事量				
		少	普通	多		
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5
/	☐	1	2	3	4	5