

SERESTO

Reg. RSCO-MEZC-INAC-1101Z-81-14.50

FICHA TÉCNICA

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Collar antiparasitario para perros y gatos

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:

Imidacloprid: (*E*)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-*N*-nitroimidazolidin-2-ylidenamina 10.00%

(Equivalente a 100 g de i.a./Kg)

Flumetrina: (RS)- α -ciano-4-fluoro-3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)
-3-(β .4-dlclorostiril)-2. 2-dimetilciclopropanocarboxilato..... 4.50%

(Equivalente a 45 g de i.a./Kg)

Ingredientes inertes:

Portador, plastificante, colorante y lubricante..... 85.50%

TOTAL 100.00%

TIPO DE FORMULACIÓN: Collar

INGREDIENTE ACTIVO: Imidacloprid y flumetrina



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Precaución



INSTRUCCIONES DE USO

INFORMACIÓN GENERAL

El collar SERESTO para perros y gatos esta indicado para el control de garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Demacantor reticulatus* y *Rhipicephalus sanguineus*) y pulgas (*Ctenocephalides felis*, *C. canis*) e infestaciones de piojos (*Trichodectes canis*) en perros y gatos la eficacia contra garrapatas y pulgas dura hasta 8 meses si el collar es llevado continuamente. En los perros y gatos, la eficacia contra garrapatas y pulgas dura hasta 8 meses si el collar es llevado continuamente.

Propiedades farmacológicas

Imidaclopríd y flumetrina son ectoparasiticidas, insecticidas y repelentes.

Imidacloprid un Ectoparasitocida clorocotinilo que tiene una alta afinidad con los receptores nicotínicos de la acetil colina en la región posináptica del sistema nervioso central de las pulgas, es muy activo contra larvas, y adultos de pulgas, piojos. Su actividad inicia de inmediato al colocar el collar.

Flumetrina es un ectoparasitocida del grupo los piretroides sintéticos que tienen acción neurotóxica sobre la membrana celular del nervio de los parásitos. Después de un estado inicial de excitación, los parásitos sufren de trastornos de coordinación, parálisis y finalmente la muerte. Flumetrina presenta una notable actividad acaricida. Los ingredientes activos son liberados continuamente de la formulación del collar. Las concentraciones insecticidas de ambos ingredientes activos están presentes en el pelaje del perro durante todo el periodo de eficacia.

ESPECIES DESTINO

Especie	Tamaño de collar	Peso del collar
Gatos	35 cm	12.5g
Perros chicos de <8Kg	35 cm	12.5g
Perros grandes de >8Kg	70 cm	45.0g

Vía de administración: tópica alrededor del cuello.

Método de aplicación del producto:

Extraer el collar de la bolsa protectora cortando la bolsa con una tijera o navaja y posteriormente desenrollar. Colocar el collar sin apretar alrededor del cuello del perro o del gato y pasar el extremo del mismo a través de la hebilla. Los propietarios deben controlar la piel en la zona del collar durante los primeros días para asegurarse de que éste no está demasiado apretado (entre el collar y el cuello debe dejarse un espacio de dos dedos). El collar debe ser llevado continuamente. Es efectivo sin tener en cuenta si el animal se mueve o si está descansando. La eficacia contra las garrapatas y las pulgas empieza dentro de las 24 horas de la aplicación del collar y dura 8 meses en perros pequeños. La duración y el nivel de protección dependen de la longitud y condición de pelaje, la actividad del animal y el grado de infestación. Ocasionalmente mientras llevan el collar pueden observarse infestación por garrapatas, pero éstas mueren lo más tarde a los 3 días normalmente sin haber succionado sangre.

CONTRAINDICACIONES

El collar SERESTO para perros menores de 8 kg y gatos no debe ser empleado en perros o gatos con lesiones cutáneas ni en perros o gatos enfermos o convalecientes.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ocasionalmente, puede observarse una ligera irritación en los primeros días tras la colocación del collar.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

No se han descrito. Como precaución general, también para otros agentes antiparasitarios, se recomienda no emplear otros insecticidas sobre el perro cuando está llevando el collar.

SEGURIDAD

Sobredosificación

No son de esperar síntomas de sobredosificación. Estudios extensivos controlados aplicando simultáneamente dos collares Seresto en perros de diferentes razas, edades y peso no produjeron ningún indicio de intolerancia local o sistémica relacionadas con el tratamiento.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: Es posible entrar en contacto con los animales tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

SERESTO para perros y gatos está destinado exclusivamente a uso externo. Evitar un excesivo contacto con el collar durante la aplicación. Durante la aplicación no comer, no beber o fumar. Lavarse las manos después de tratar a los animales. No permitir a los niños jugar con el collar. Guardar lejos del alcance de los niños. Mantener lejos de los alimentos, bebidas, forrajes. No utilizar después de la fecha de caducidad. Mantener el envoltorio bien cerrado hasta el momento del empleo. El collar SERESTO para perros y gatos es tóxico para las abejas y los peces. Se recomienda quitar el collar al bañar al animal y colocárselo de nuevo cuando el pelo esté seco.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación por contacto accidental, tomar las siguientes acciones:

Eliminar la ropa empapada o contaminada inmediatamente. Alejar al paciente de la zona del peligro, si existe el riesgo de inconciencia, transporte y coloque al afectado en una posición estable. Llevar a la persona accidentada al aire libre. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos. Acuda al médico de inmediato.

DESPUÉS DE UN CONTACTO SOBRE LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con jabón y agua abundantes. Si lo requiere contacte a un médico.

DESPUÉS DE UN CONTACTO CON LOS OJOS: Puede ocasionar irritación ocular. En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos con abundante agua, consulte a un oculista.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Este producto pertenece al grupo químico de los cloronicotinilos y piretroides, los cuales son irritantes ligeros y en personas sensibles dan lugar a reacciones de tipo alérgico, usualmente no graves. Signos y síntomas de intoxicación: **Contacto por la boca:** en caso de exposición o ingestión accidental se puede presentar dolor de cabeza, mareo, náusea y vómito, agitación, molestia gastrointestinal y dolor epigástrico; **Contacto con la piel:** se puede presentar en primera instancia una sensación de hormigueo en el área peri orbital de la cara, parestesia local y ligera irritación; **Contacto por los ojos:** también puede presentarse una ligera irritación; **Por inhalación:** irritación en el trato respiratorio y tos. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles.

Antídoto: no existe antídoto específico. **Tratamiento:** sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado así como laxantes salinos.

USO VETERINARIO

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE SEMARNAT.
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS.

Elanco Salud Animal, S.A. de C.V.
Boulevard Puerta de Hierro No.5153,
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,
Zapopan C.P.45116, Jalisco.
Tel.:800 000 7387
e-mail: animal.health@sykes.com