

ADVANTAGE MULTI
(gatos y hurones)

Reg. RSCO-PEC-INAC-0199-0095-359-10

FICHA TÉCNICA

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Insecticida, acaricida, endoparasiticida de uso pecuario en gatos y hurones

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:

Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazoli-din-2-ilidenamina 10.00%

(Equivalente a 109.80 g de i.a./L a 20°C)

Moxidectina: 3-(O-methyloxime)-F28249-alpha..... 1.00%

(Equivalente a 10.98 g de i.a./L)

Ingredientes inertes:

Solventes y Antioxidante..... 89.00%

TOTAL 100.00%

La moxidectina es un endoparasiticida sistémico que controla estados larvarios (L3, L4) de los siguientes parásitos internos: *Dirofilaria immitis* y nematodos gastrointestinales. Interfiere con diferentes receptores GABA y los canales de cloruro de glutamato de los parásitos causándoles parálisis, flacidez seguida de la muerte y/o expulsión

TIPO DE FORMULACIÓN: Solución tópica

INGREDIENTE ACTIVO: Imidacloprid y moxidectina



Nocivo en caso de ingestión

Nocivo si se inhala

Precaución



USO VETERINARIO

INSTRUCCIONES DE USO
INFORMACIÓN GENERAL

ADVANTAGE MULTI es una solución tópica compuesta de un insecticida ectoparasiticida (imidacloprid) y un ingrediente endoparasiticida (moxidectina) para usarse en gatos y hurones para el control de pulgas y gusano del corazón y el tratamiento de ácaros y nematodos intestinales en gatos.

La moxidectina es un endoparasiticida sistémico que controla estados larvarios (L3, L4) de los siguientes parásitos internos: *Dirofilaria immitis* y nematodos gastrointestinales. Interfiere con diferentes receptores GABA y los canales de cloruro de glutamato de los parásitos causándoles parálisis, flacidez seguida de la muerte y/o expulsión

INDICACIONES

- Elimina el 91% de las pulgas adultas (*Ctenocephalides canis* y *Ctenocephalides felis*) presentes en su perro o gato en 6 horas, y a las pulgas del ambiente (reinfestantes) en menos de 1 hora.
- Efecto larvicida en el medio ambiente que rodea a la mascota.
- Para perros y gatos de cualquier raza y tamaño (desde los 2 meses de edad).
- Eficaz aún después del baño o la lluvia.
- Previene reinfestaciones por un mes.
- Para perras y gatas en cualquier etapa (gestación, lactancia, etc).
- Puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Gatos: Las dosis mínimas recomendadas son de 10 mg/kg de peso de imidacloprid y 1.0 mg/kg de peso de moxidectina, equivalente a 0.1 ml/kg peso de ADVOCATE / ADVANTAGE MULTI / BAYOPET ADVANTAGE / BAYOPET ACTIRÁPIDO para gatos.

Hurones: Debe administrarse una pipeta de ADVOCATE / ADVANTAGE MULTI / BAYOPET ADVANTAGE / BAYOPET ACTIRÁPIDO solución para unción dorsal puntual para gatos pequeños (0.4 ml) por animal. No exceder la dosis recomendada.

Espece	Peso corporal	Dosis (pipeta)	Plaga
Gatos	1 a 4 Kg	1 pipeta de 0.4 mL	Pulgas: <i>Ctenocephalides felis</i> Ácaros: <i>Otodectes cynotis</i> <i>Notoedres cati</i> Gusano del corazón <i>Dirofilaria immitis</i> Nemátodos intestinales (Gusanos redondos): <i>Ancylostoma tubaeforme</i> <i>Toxocara cati</i> Nemátodos pulmonares: <i>Capillaria aerophila</i>
	4 a 8 Kg	1 pipeta de 0.8 mL	
	Más de 8kg	Combinación adecuada de pipetas Ejemplo: Gato 10 kg = 1 pipeta de 0.8 mL + 1 pipeta de 0.4 m	
Hurones	800g a 4 Kg	1 pipeta de 0.4 mL	Pulgas: <i>Ctenocephalides felis</i> Gusano del corazón: <i>Dirofilaria immitis</i>

Vía de administración: tópica (unción dorsal)

USO VETERINARIO

Frecuencia de aplicación: El calendario o momento del tratamiento debe basarse en factores epidemiológicos y ser personalizado para cada animal, por lo que es recomendable que consulte un médico veterinario para determinar el diagnóstico correcto y la terapéutica más adecuada para su mascota. La frecuencia de aplicación del producto sugerida es la siguiente:

GATOS:

- **Pulgas (*Ctenocephalides felis*):** Un tratamiento previene la infestación futura por pulgas durante 4 semanas, se sugiere administrarse mensualmente como tratamiento estratégico de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas.
- **Ácaros de los oídos (*Otodectes cynotis*):** Una sola dosis, se recomienda realizar examen veterinario a los 30 días tras el tratamiento para determinar si es necesaria una segunda aplicación. No aplicar directamente en el canal auricular.
- **Sarna notoédrica (*Notoedres cati*):** Debe administrarse una sola dosis del producto.
 - **Eucoleosis (*Eucoleus* syn. *Capillaria aerophila*):** Debe administrarse una sola dosis del producto.
 - **Dirofilariosis (*Dirofilaria immitis*):** Para la prevención del gusano del corazón, administrar el producto mensualmente durante la época de mosquitos. Puede administrarse todo el año o desde 1 mes previo a la exposición a los mosquitos (huéspedes intermediarios que transportan y transmiten las larvas de *Dirofilaria immitis*). El tratamiento debe continuarse de modo regular una vez al mes hasta 1 mes después de la última exposición a los mosquitos. Para establecer una rutina de tratamiento, se recomienda administrar la pipeta el mismo día o fecha de cada mes.
- **Nemátodos intestinales (*Toxocara cati* y *Ancylostoma tubaeforme*):** El producto puede utilizarse como parte de un programa estacional preventivo de nemátodos gastrointestinales administrando una dosis en cada ocasión.


HURONES:

- **Pulgas (*Ctenocephalides felis*):** Un tratamiento previene la infestación futura por pulgas 3 semanas. En casos de infestación masiva, puede ser necesario repetir la aplicación después de 2 semanas.
- **Dirofilariosis (*Dirofilaria immitis*):** Para la prevención del gusano de corazón causado por *Dirofilaria immitis*, administrar el producto mensualmente durante la época de mosquitos. Puede administrarse todo el año o desde 1 mes previo a la exposición a los mosquitos (huéspedes intermediarios que transportan y transmiten las larvas de *Dirofilaria immitis*). El tratamiento debe continuarse de modo regular una vez al mes hasta 1 mes después de la última exposición a los mosquitos.

Intervalo entre cada aplicación: El efecto dura por lo menos 4 semanas en perros y hasta 4 semanas o más en gatos. En caso de infestaciones repetir el tratamiento cada mes. En caso de infestación severa cerrar el intervalo de aplicaciones hasta aplicarlo mensualmente.


Método de aplicación del producto:

1. Determine el peso del gato para calcular la dosis a aplicar
2. Seleccionar la presentación de adecuada del producto según el peso del animal.
3. Sacar una pipeta del paquete. Poner el producto en posición vertical (hacia arriba la tapa).
4. Quitar la tapa de la pipeta, invertirla, colocarla sobre el tubo y girarla hasta que se rompa el sello.
5. Retirar la tapa.



**USO VETERINARIO**

6. De preferencia el animal debe estar parado.

a. En gatos separar el pelo en la base de la nuca, hasta ver la piel y aplicar



b. En hurones separar el pelo en la base de la nuca, hasta ver la piel y aplicar



CONTRAINDICACIONES

Evitar el contacto del producto con los ojos y boca del animal.

No se recomienda su uso en perros, producto formulado para uso exclusivo en gatos y hurones.

Consulte al médico veterinario.

SEGURIDAD

Peligros de toxicidad del plaguicida para la especie animal a la que se aplique, así como para los animales que se encuentran próximos durante la aplicación: No se han reportado signos de intolerancia a sobredosis. En el gato puede presentarse salivación si este se lame la piel, este signo es de intoxicación y desaparece minutos después de la aplicación del producto. Esto se evita si se aplica el producto en la nuca del gato, para evitar que se lama. Retirar a todos los animales que no vayan a ser tratados con el producto.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: Es posible entrar en contacto con los animales tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de ADVANTAGE® MULTI deberá utilizar, bata, guantes de vinilo o nitrilo y lentes de seguridad.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Retirar a la persona de la zona de intoxicación. Quitarle inmediatamente la ropa contaminada. Acostar, y si está capacitado y cuenta con el equipo adecuado, colocar y transportar al afectado en posición lateral estable. En caso de contacto con los ojos enjuagarlos cuidadosamente con agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión y si la situación de la persona lo permite, dar a ingerir un vaso con agua. No provocar el vómito. Consúltese al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Insecticida del grupo químico de los neonicotinoides.

Signos y síntomas de intoxicación por vía oral, dérmica e inhalatoria: en caso de exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles.

Antídoto: no existe antídoto específico.

Tratamiento: sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado, así como laxantes salinos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE SEMARNAT.
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ÉSTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).

Elanco Salud Animal, S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro No.5153,

Piso 18, Col. Puerta de Hierro,

Zapopan C.P.45116, Jalisco.

Tel.:800 000 7387

e-mail: animal.health@sykes.com