

GALLIPRANT 20 mg Reg. Q-0715-162
GALLIPRANT 60 mg Reg. Q-0715-163
GALLIPRANT 100 mg Reg. Q-0715-164

Antiinflamatorio no esterooidal (AINE) antagonista del receptor de prostaglandinas EP4.

FÒRMULA:

Ingrediente	Galliprant 20mg	Galliprant 60mg	Galliprant 100mg
Grapiprant	250mg	750 mg	1250 mg
Tabletas/comprimidos:	7	30	90

TIPO DE FORMULACIÒN: Tabletas masticables

INGREDIENTE ACTIVO: Grapiprant

INDICACIONES

Galliprant está indicado para el control y la inflamación asociados a osteoartritis en perros.

DOSIS, FRECUENCIA Y DURACIÒN DEL TRATAMIENTO

Dosis princpio activo: administrar una dosis objetivo de 2 mg/kg de peso corporal, una vez al día lo que equivale a un rango de dosis de 1.5 – 2.9 mg/kg de peso corporal.

Dosis de producto: administrar Galliprant una vez al día de acuerdo a la siguiente tabla:

Peso del perro (kg)	GALLIPRANT 20 mg tabletas	GALLIPRANT 60 mg tabletas	GALLIPRANT 100 mg tabletas
3.6-6.8	0.5		
6.9-13.6	1		
13.7-20.4		0.5	
20.5-34.0		1	
34.1-68.0			1
68.1-100.0			2

No hay un límite máximo para la duración del tratamiento para el tratamiento. Para el tratamiento a largo plazo, se recomienda un monitoreo adecuado.

VÍA DE ADMINISTRACIÒN Y MODO DE EMPLEO

Administrar por vía oral con o sin alimentos.

Efectos no deseados u reacciones adversas:

En perros tratados con Galliprant, se han observado las siguientes reacciones adversas leves y generalmente transitorias: vòmitos, heces blandas o mucosas, diarrea e inapetencia.

En los perros tratados con dosis aumentadas de grapiprant, se han decensos leves en las concentraciones de seroalbúmina y de proteínas totales, pero no se asociaron a ninguna observaciòn o evento clínicamente significativo y fueron reversibles cuando el tratamiento fue descontinuado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

La seguridad de grapiprant no se ha establecido en perros con un peso inferior a 3.6 kg o menores a 9 meses de edad.

El uso de Galliprant en perros con enfermedad cardiaca no ha sido estudiado.

No se ha evaluado la seguridad de Grapiprant es un sustrato, pero no un inhibidor de transporte de Glicoproteína-P.

CONTRAINDICACIONES

Grapiprant es una metilbencenosulfonamida. No se sabe si los perros con antecedentes de hipersensibilidad a las sulfonamidas mostrarán hipersensibilidad al grapiprant. No aplicar en perros con hipersensibilidad al hígado de cerdo.

Sobredosis:

En perros sanos tratados con Grapiprant durante 9 meses consecutivos, con sobredosis diarias de 6 mg/kg y 50 mg/kg de peso corporal, se observaron de manera leve y transitoria, heces blandas o mucosas y vómitos. Grapiprant no produce ningún signo de toxicidad renal o hepática.

No hay antídoto específico para Grapiprant. Se recomienda una terapia sintomática y de soporte.

Precauciones para el operador:

Lávese las manos después de manipular el medicamento veterinario.

En caso de ingestión accidental, consultar con un médico inmediatamente y mostrar el inserto o la etiqueta del producto.

La ingestión accidental en niños pequeños puede aumentar el riesgo de efectos adversos.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 15-30 °C, en su envase original cerrado.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

MEXICO: **GALLIPRANT 20 mg Reg. Q-0715-162**
 GALLIPRANT 60 mg Reg. Q-0715-163
 GALLIPRANT 100 mg Reg. Q-0715-164
 USO VETERINARIO
 CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
 Su venta requiere receta médica

COLOMBIA: Registro ICA No.
 VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO