



**Drontal Plus + Sabor**  
Reg. Q-0715-170

**Antiparasitario de amplio espectro para perros**

**FÓRMULA:**

Cada tableta contiene:

Praziquantel .....	175 mg
Embonato de Pirantel .....	504 mg
Febantel .....	525 mg
Excipiente c.b.p. ....	3948.9 mg

**TIPO DE FORMULACIÓN:** Tabletas saborizadas

**INGREDIENTE ACTIVO:** Praziquantel, Embonato de Pirantel y Febantel.

**DESCRIPCIÓN**

Presentación: Caja con 24 tabletas.

**INDICACIONES**

**Drontal Plus + Sabor** actúa contra las formas maduras e inmaduras de los siguientes nematodos, cestodos y protozoarios:

**Nematodos:** *Ancylostoma braziliense*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*.

**Cestodos:** *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipilydium caninum*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia ovis*, *Taenia multiceps*, *Taenia taeniaformis*, *Mesocestoides* spp., *Joyeuxiella pasqualei*.

**Protozoarios:** *Giardia* spp.

**Drontal Plus + Sabor** es muy bien tolerado. No es necesario tomar medidas dietéticas, ni suprimir la ración a los animales. **Drontal Plus + Sabor** puede administrarse directamente en la boca de la mascota o puede colocarse dentro de un trozo de carne u otro alimento, o triturarlo con la comida.

**DOSIS Y VÍA ADMINISTRACIÓN**

Colocar la(s) tableta(s) en la base de la lengua y asegurarse que sea(n) tragada(s) correctamente por la mascota.

**Dosificación:**

1 Tableta (equivalente a 15 mg de Febantel, 14 mg de Embonato de Pirantel y 5 mg de Praziquantel por cada kg de eso vivo) por cada 35 Kg de peso corporal en una sola dosis según la siguiente tabla:

Animales de 7 a 17.5 kg:.....	½ tableta
Animales de más de 17.5 kg y hasta 35 kg:.....	1 Tableta
Animales de más de 35 kg y hasta 52.5 kg:.....	1 ½ Tableta
Animales de más de 52.5 kg y hasta 70 kg:.....	2 Tabletas

\*Administrar ½ tableta por cada 17.5 Kg de peso adicional a partir de 20 kg de peso corporal.



**Drontal Plus + Sabor**  
**FICHA TÉCNICA**

Página **2** de **2**

Para tratar los casos de Giardiasis se debe administrar 1 tableta por cada 35 Kg de peso corporal durante tres días seguidos.

**Duración del tratamiento:** Administrar la(s) tableta(s) en una sola toma. En infestaciones por vermes que hayan sido diagnosticadas, siempre debe realizarse una desparasitación inmediata y repetir el tratamiento a los 15 días.

**Recomendaciones para el control de parásitos:** Desparasite a todos los perros y gatos de la casa el mismo día. Los perros mayores de 6 meses y los perros adultos se deben desparasitar cada tres meses. Las perras se deben desparasitar antes de la monta.

**Contraindicaciones:** No usar en perras durante la preñez temprana (2 primeros tercios) hasta que no se hayan realizado estudios. No usar simultáneamente con productos a base de piperazina.

**ADVERTENCIAS:**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.  
Consérvese entre 0° y 30°C.

**“Uso Veterinario”**  
**"Consulte al Médico Veterinario"**  
**"Su venta Requiere Receta Médica".**

**Elanco Salud Animal S.A. de C.V.**  
Boulevard Puerta de Hierro No.5153,  
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,  
Zapopan C.P. 45116, Jalisco.  
Tel.: 800 288 5553  
e-mail: saclatam@elancoah.com

**DRONTAL PLUS + SABOR**

Reg. Q-0715-240

**Antiparasitario oral de amplio espectro en tabletas para perros de 10 kg****FÓRMULA:**

Febantel .....150 mg  
Embonato de pirantel .....144 mg  
Praziquantel .....50 mg

**TIPO DE FORMULACIÓN:** Tabletas**INGREDIENTES ACTIVOS:** Febantel, Embonato de pirantel y Praziquantel**INDICACIONES:**

Drontal Plus + Sabor actúa con total eficacia frente a los siguientes parásitos:

Nemátodos: Ascaridos (adultos y formas inmaduras tardías) de: *Toxocara canis* (adultos y formas inmaduras tardías) *Toxascaris leonina* (adultos y formas inmaduras tardías), *Uncinaria stenocephala* (adultos), *Ancylostoma caninum* (adultos), *Trichuris vulpis* (adultos), Cestodos: (adultos y formas inmaduras tardías) de: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., (en Chile *Taenia hidatygena*, *Taenia psiforme*, *Taenia ovis*), *Mesocestoides* spp., *Multiceps multiceps*, Protozoarios: *Giardia* spp., (en cachorros y perros adultos).

**VIA DE ADMINISTRACIÓN:**

Drontal Plus + Sabor, se administra por vía oral. Las tabletas están saborizadas y los estudios demuestran que son muy palatables por lo que los perros las ingieren voluntariamente en la mayoría de los casos probados. Colocar la(s) tableta(s) en la base de la lengua y asegurarse que sea(n) tragada(s) correctamente por la mascota. Las tabletas pueden ser administradas con o sin alimento. No es necesario limitar el acceso a la comida previo o posteriormente al tratamiento.

**DOSIS:**

1 tableta para perros de Drontal Plus + Sabor equivale a 5-12.5 mg de praziquantel, 14.4-36 mg de embonato de pirantel y 15-37.5 mg de febantel por kg de peso.

2 a 5 Kg de peso corporal: 1/2 tableta  
>5 a 10 Kg de peso corporal: 1 tableta  
>10 a 15 Kg de peso corporal: 1 1/2 tableta  
>15 a 20 Kg de peso corporal: 2 tabletas

\*Por cada 5 Kg de peso corporal adicional, administrar 1/2 tableta adicional.

Tratamiento para cestodos y nemátodos: administrar 1 sola toma.

Tratamiento para giardias: administrar tres días seguidos con intervalo de 24 horas.

**DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:**

Se deberá establecer un programa de desparasitación consultando al Médico Veterinario. Como regla general para animales adultos mayores a 6 meses deberá utilizarse un esquema de aplicación cada tres meses. Si el dueño del animal elige no utilizar un tratamiento de desparasitación periódico, deberá examinarse la materia fecal cada tres meses. En situaciones específicas como perras lactantes, o animales jóvenes menores a 6 meses, o ambientes de criadero, se deberá utilizar con mayor frecuencia y buscar el asesoramiento de un Médico Veterinario para establecer un protocolo de desparasitación apropiado.

De igual manera, en situaciones tales como infestaciones graves de gusanos redondos o infestaciones por *Echinococcus* serán necesarios más tratamientos, de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante.

**RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE PARÁSITOS:**

Desparasite a todos los perros y gatos de la casa el mismo día.

**CONTRAINDICACIONES:**

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus principios activos. No utilizar durante los dos primeros tercios de la gestación. No utilizar en animales que pesan menos de 2 kg.

**INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:**

No usar con otros colinérgicos (ej. levamisol). Potencial aumento del efecto de sustancias activas con actividad acetilcolinesterasa (ej. organofosforados). La actividad específica de piperazina (parálisis neuromuscular de parásitos) pueden inhibir la eficacia del pirantel (parálisis espástica de parásitos).

**SOBREDOSIFICACIÓN Y EFECTOS ADVERSOS:**

El producto posee un amplio margen de seguridad. Dosis de hasta 10 veces la recomendada no provoca signos adversos. En perros con infestaciones intensas por endoparásitos acompañadas de lesiones de la pared intestinal puede haber una mayor absorción del pirantel. Este incremento en la absorción puede provocar síntomas como temblor muscular, salivación, diarreas, evacuación intestinal y reducción de la actividad de la colinesterasa en sangre. Si aparecieran estos efectos adversos se debe administrar atropina como antídoto.

En casos muy raros pueden presentarse leves desórdenes del tracto digestivo leves y pasajeros (por ejemplo vómitos). La frecuencia de las reacciones adversas se define utilizando la siguiente leyenda: Muy raro (menos de 1 en 10.000 animales, incluyendo reportes aislados).

**ADVERTENCIAS:**

Las pulgas actúan como huéspedes intermediarios para el cestodo *Dipylidium caninum*. Por lo tanto deberá realizarse el control de los huéspedes intermediarios tales como pulgas, ratones, etc. para impedir la reinfestación por *Dipylidium caninum*.

**PRECAUCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE EL MEDICAMENTO VETERINARIO A LOS ANIMALES:**

En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y se deberá mostrar el prospecto o la etiqueta del producto al médico. Lavarse bien las manos luego de la manipulación del producto. *Giardia* spp. puede infestar a humanos, por lo tanto consulte al médico en caso de que la mascota contraiga la infestación.

Este medicamento veterinario contiene praziquantel por lo que es eficaz frente a *Echinococcus* spp. La Equinococosis representa un riesgo para los humanos. Como la Equinococosis es una enfermedad notificable ante la OIE, deberán seguirse guías específicas de tratamiento y seguimiento posterior, así como sobre la seguridad de las personas.

**PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO:**

No arrojar el producto junto con los desechos domésticos. No eliminar en el suelo o en cursos de agua. Como producto medicinal, debe ser enviado a un servicio de recolección y eliminación de desechos especiales.



**DRONTAL PLUS + SABOR**  
**FICHA TÉCNICA**

Página **3** de **3**

---

**ALMACENAMIENTO:**

Una vez abierto el blíster, los medios comprimidos restantes deben ser envueltos en papel de aluminio y regresados al blíster abierto y utilizarlos dentro de los 7 días de abierto el blíster. Almacenar a una temperatura entre 15°C y 30°C Almacenar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**USO VETERINARIO**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**  
**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

**Elanco Salud Animal S.A. de C.V.**

Boulevard Puerta de Hierro No.5153,  
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,  
Zapopan C.P. 45116, Jalisco.  
Tel.: 800 288 5553



---

**Drontal Puppy**  
Reg. Q-0715-205

**Desparasitante de amplio espectro para perros**

**FÓRMULA:**

Cada 1 mL contiene:

Febantel .....	15.0 mg
Pamoato de Pyrantel .....	14.4 mg
Excipiente c.b.p. ....	1 mL

**TIPO DE FORMULACIÓN:** Suspensión oral.

**INGREDIENTE ACTIVO:** Febantel y Pamoato de Pyrantel.

**DESCRIPCIÓN**

Presentación: Caja con 1 frasco de 20, 50 o 100 mL.

**INDICACIONES**

**Drontal® puppy** es un desparasitante de amplio espectro para cachorros de perro, el efecto sinérgico de sus 2 principios activos, Febantel y Pyrantel ofrece un desparasitante único de amplio espectro contra las formas adultas y larvianas de los helmintos más comunes de los perros. El efecto sinérgico comprobado y patentado por Elanco de los componentes de la fórmula de **Drontal® puppy** le confiere un espectro de acción y una potencia más amplias que cualquier otro antihelmíntico en el mercado.

**Drontal® puppy** está diseñado especialmente para combatir las formas adultas y larvianas de nemátodos gastrointestinales y protozoarios que afectan a los cachorros de perro y a los adultos de perro de talla miniatura. Su espectro incluye:

• *Toxocara canis* • *Toxocara cati* • *Toxascaris leonina* • *Baylisascaris procyonis* • *Ancylostoma caninum* • *Ancylostoma braziliense* • *Ancylostoma tubaeforme* • *Uncinaria stenocephala* • *Trichuris vulpis* • *Giardia* spp.

**Modo de acción:**


Eficacia

**Drontal® puppy** ha sido probado en gran cantidad de perros de varias edades, razas y sexos. La eficacia ha sido demostrada en estudios críticos y clínicos contra los nemátodos más comunes de los perros. El pyrantel es un antihelmíntico con alta eficacia contra Ascáridos y Ancylostomas en perros, pero sin eficacia contra Tricúridos. Febantel tiene un espectro de actividad que incluye Ascáridos, Ancylostomas y también Tricúridos.

Efecto sinérgico

Elanco ha desarrollado una fórmula nematicida eficaz y de alta calidad, ya que el pyrantel y el febantel fueron probados por separado y en combinación, logrando un excelente efecto sinérgico contra la mayoría de los nemátodos (*Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Ancylostoma caninum* y *Trichuris vulpis*). Con una sola dosis elimina hasta el 100% de estos parásitos.

**Sitios de acción sinérgica de Pyrantel y Febantel (Drontal®) sobre el organismo del parásito:**



**Efectos de Febantel, de Pyrantel y de la combinación de ambos, sobre las estructuras y órganos de nemátodos.**

<b>Organo del parásito</b>	<b>Pyrantel</b>	<b>Febantel</b>	<b>DRONTAL® (Pyrantel y Febantel)</b>
Cutícula	-	-	-
Hipodermis	+	++	+++
Células musculares	+	+ / ++	+++
Intestino	+	- / +	+++
Axones nerviosos	-	+	+++
Sistema sexual	-	+	+++
Canales excretorios	-	+	++

- Sin efecto    + Acción leve    ++ Acción moderada    +++ Alto efecto degenerativo

Desparasitación estratégica

La Desparasitación estratégica reduce el riesgo de enfermedades zoonóticas (enfermedades transmitidas de los animales al hombre) y mantiene a las mascotas saludables.

La Desparasitación Estratégica consiste en desparasitar con un calendario estratégico a sus mascotas para prevenir o reducir parasitosis clínicas y contaminación ambiental. (Consulte a su Médico Veterinario para que le indique el calendario de desparasitación estratégica de acuerdo a su zona).

Las metas de la desparasitación estratégica son:

- Reducir el daño orgánico a las mascotas.
- Prevenir la reproducción del parásito.
- Reducir la contaminación ambiental.
- Reducir las enfermedades zoonóticas.

Se recomienda establecer un programa estratégico de desparasitación de acuerdo a la edad del animal.

**Calendario de Desparasitación Estratégica:**

<b>Cachorros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A partir de las 2 semanas de edad, cada 2 semanas hasta los 3 meses de edad con <b>Drontal® puppy</b>.</li><li>• Una vez al mes de los 3 a los 6 meses de edad con <b>Drontal® plus</b>.</li><li>• Cuatro veces por año después de los 6 meses de edad (cada 3 meses) con <b>Drontal® plus</b>.</li></ul>
<b>Perros adultos</b>	Tratar regularmente, considerando la exposición potencial a los parásitos y los periodos de prepatencia (4 veces al año, una vez cada 3 meses).
<b>Perras para cría</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antes de la monta.</li><li>• 2 semanas antes de la fecha probable de parto.</li><li>• Al parto.</li><li>• A las 2 y 4 semanas posteriores al parto (conjuntamente con los cachorros).</li><li>• Continuar una vez cada tres meses.</li></ul>
<b>Adquisición de nuevas mascotas (cachorros y/o adultos)</b>	Desparasitar inmediatamente que llegan al hogar; repetir la dosis en 2 semanas y continuar 1 vez cada tres meses.

**Recomendaciones:**

Cada *Ancylostoma caninum* adulto ingiere cerca de 0,1 ml de sangre por día, en infestaciones severas puede ser fatal para los cachorros. Durante la migración las larvas producen daño hepático. Las larvas de este parásito pasan la barrera placentaria y los cachorros nacen infestados, otras larvas pasan de la glándula mamaria a la leche, infestando a los cachorros, también penetran activamente por la piel o son ingeridas a partir de un ambiente contaminado.

Los Ancylostomas pueden provocar severas anemias y daño hepático aún antes de manifestarse clínicamente con huevos en las heces de los cachorros. El *Toxocara canis* infesta a los cachorros atravesando la barrera placentaria; llegando a la leche a través de la glándula mamaria; o por la ingestión de huevos. La madre puede eventualmente adquirir estos parásitos ingiriendo aves o roedores silvestres.

Las larvas de estos dos parásitos permanecen inactivas en la musculatura de la madre, provocando infestaciones en camadas consecutivas. Dadas las condiciones de infestación y los períodos de prepatencia de los diferentes parásitos es importante que la madre sea desparasitada de acuerdo al calendario sugerido en este instructivo.

Los perros de razas miniatura pueden ser tratados cada tres meses con esta suspensión. Estudios de toxicidad en los productos indican un amplio margen de seguridad sin contraindicaciones o efectos colaterales

**DOSIS Y VÍA ADMINISTRACIÓN**







**Drontal® puppy** debe ser administrado exclusivamente por vía oral en una sola toma.

**Drontal® puppy** es bien tolerado. Administrar 1 ml por cada kilogramo de peso corporal.

- Administrar directamente por vía oral o junto con el alimento.
- No es necesario restringir la alimentación o administrarlo en ayunas.
- En caso de infestación por *Giardia* spp. el tratamiento deberá administrarse durante dos días consecutivos.



**Tabla de dosificación:**

Peso del animal	Drontal® puppy	Drontal® plus		Drontal® plus perros grandes	
Cachorros	1 ml/kg de p.c.				
Perros de 2,6 - 5 kg		1/2 tab			
Perros de 5,1 - 10 kg		1 tab			
Perros de 11 - 17,5 kg		2 tab		1/2 tab	
Perros de + de 20 kg				1 tab	
Perros de + de 35 kg				2 tab	

Control de Toxocariasis y Ancylostoma:

- Con el objeto de eliminar infestaciones adquiridas por vía prenatal e infestaciones por leche, se recomienda desparasitar a los cachorros a las 2 semanas de edad y repetir el tratamiento 15 días después con **Drontal® puppy** hasta los tres meses de edad.
- En el caso de las madres se recomienda el tratamiento al mismo tiempo que en los cachorros con **Drontal® plus**.
- Con el objeto de eliminar infestaciones adquiridas por vía prenatal, es necesario realizar un tratamiento estratégico en los cachorros de dos semanas de edad para eliminar la posible transmisión de Toxocaras y Ancylostomas vía lactogénica o por reinfestación de huevos eliminados en las heces, y evitar la contaminación del medio ambiente con huevos, pues estos sirven como fuente de reinfección por años.

Control estratégico contra Dipylidium caninum:

Los nemátodos del perro constituyen un serio riesgo para la salud del hombre. Debido a que las pulgas juegan un importante papel, como huésped intermediario, dentro del ciclo de vida del *Dipylidium caninum*, es necesario efectuar un control simultáneo y estratégico contra las pulgas. Se recomienda el uso de Advantage o Advantix y en el entorno ambiental la aplicación de Super Bolfo Reforzado, para el control de pulgas. Consulte al Médico Veterinario para adecuar el tratamiento a cada situación particular. Se recomienda potabilizar el agua de sus mascotas.

**ADVERTENCIAS:**

- No administrar simultáneamente con compuestos piperazínicos.
- No administrar después de la fecha de caducidad.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- No se exponga a la luz solar directa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales.
- Agítese antes de usar.

**"Uso Veterinario"**  
**"Consulte al Médico Veterinario"**  
**"Su venta Requiere Receta Médica".**

**Elanco Salud Animal S.A. de C.V.**  
Boulevard Puerta de Hierro No.5153,  
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,  
Zapopan C.P. 45116, Jalisco.  
Tel.: 800 288 5553